

بررسی دوشکلی جنسی در نسبت طول انگشتان دوم تا چهارم (2D:4D) در دو گونه وزغ سبز و وزغ پابیله‌ای

ایمان علی‌نژادی^۱, نسترن حیدری^۲ و حسین جوان بخت^۱

^۱ گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ ^۲ گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

مسئول مکاتبات: نسترن حیدری، heydari.ns@knu.ac.ir

چکیده. دوشکلی جنسی در نسبت طول انگشتان یک و بی‌پنجه مورفولوژیکی حاصل از برهمکنش بین هورمون‌های جنسی و زن‌های Hox قبل از تولد بوده که تکوین هر دوی اندام‌های حرکتی دست‌ها و پاهای اندام‌های جنسی را کنترل می‌کند. وضعیت این روند و نسبت‌ها در گروه‌های مختلف جانوری از جمله در انسان، دیگر پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان بررسی شده است. در این مطالعه، دوشکلی جنسی از لحاظ نسبت بین طول انگشتان II (2D:3D, IV (2D:4D, 3D:4D) 2Dست و پای چپ، در ۵۴ نمونه از وزغ‌ها مشکل از گونه *Bufo viridis* (۱۶ نمونه نر و ۱۹ نمونه ماده) و گونه *Pelobates syriacus* (۱۰ نمونه نر و ۹ نمونه ماده) در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در *Pelobates syriacus* ماده‌ها دارای میانگین طول بدن (SVL) بیشتری نسبت به نرها بودند و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود ($P \leq 0.05$). در گونه *Bufo viridis* نیز ماده‌ها دارای میانگین طول بدن بیشتری از نرها بودند اما این اختلاف بین افراد نر و ماده از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. نسبت اندازه طول انگشتان دست و پا در سمت چپ بدن برای هر دو گونه از لحاظ (2D:3D, 2D:4D, 3D:4D) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هیچ کدام از صفات مورد بررسی در اندام‌های حرکتی جلویی و عقبی، اختلاف معنی‌داری بین افراد نر و ماده در گونه *Bufo viridis* مشاهده نشد. اما از لحاظ 2D:4D بین افراد نر و ماده در گونه *Pelobates syriacus* اختلاف معنی‌دار (P=0.40) وجود داشت و این نسبت در افراد نر بیشتر از ماده‌ها بود. بنابراین، وجود تفاوت‌های معنی‌دار در این انگشتان در گونه *Pelobates syriacus* همانگ با این الگوی تغییرات در بیشتر دوزیستان و دیاپسیدها است.

کلمات کلیدی. تکوین، دوزیستان، ژن هاکس، مهروه داران، مورفولوژی

Sexual dimorphism in digit length ratios of the second to fourth digits (2D:4D) in two species of green toads (*Pelobates syriacus* Boettger, 1889 and *Bufo viridis* (Laurenti, 1768))

Iman Alinezhadi¹, Nastaran Heidari² & Hossein Javanbakht¹

¹Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran; ²Department of Animal Biology, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran

Corresponding author: Nastaran Heidari, heydari.ns@knu.ac.ir

Abstract. Sexual dimorphism in the ratio of digits length is a morphological feature resulted from the interaction between sex hormones and prenatal Hox genes, the latter is known to control the development of both limbs and genitals. The status of this trend and ratios have been investigated in various animal groups, including humans, other mammals, birds, reptiles, and amphibians. In this study, the body length and sexual dimorphism in the second-to-fourth, second-to-third and third-to-fourth digit lengths ratios (i.e., 2D:3D, 2D:4D, 3D:4D) of left fore and hind limbs were investigated in 54 specimens of toads collected from the northern Iran, including *Bufo viridis* (16 males and 19 females) and *Pelobates syriacus* (10 males and 9 females). In addition, the body length of the studied specimens were recorded. The results showed that the average body length (SVL) of female individuals of *Pelobates syriacus* was higher than those in males, which was found to be statistically significant ($P \leq 0.05$). Meanwhile, the average body length (SVL) of female individuals of *Bufo viridis* was found to be higher than those in males, however, the difference was not statistically significant. No sexual dimorphism was detected in the second-to-fourth, second-to-third and third-to-fourth digit lengths ratios of left fore and hind limbs between the male and female undivided individuals of *Bufo viridis*. However, the second-to-fourth digit ratio

(2D:4D) in *Pelobates syriacus* species were found to be significantly different ($P=0.040$) between the male and female individuals, as the ratio was higher in males than females. Therefore, it could be concluded that the sexual dimorphism in 2D:4D of *Pelobates syriacus* species is consistent with those in most amphibians and diapsids.

Key words. Amphibia, development, Hox gene, morphology, vertebrates

جنینی بیان می‌شوند (Kondo et al., 1997). بنابراین تکوین انگشتان و اندام‌های جنسی تحت کنترل بیان یک سری مشابه از ژن‌ها هستند. برای مثال، در انسان‌ها سندروم دست-پا-دستگاه تناسلی که مشخصه آن چسبیده شدن دو یا چندین انگشت دست یا پا به همدیگر است و همچنین برخی ناهنجاری‌ها در دستگاه تناسلی، حاصل از جهش در ژن‌های هاکس است (Mortlock & Innis, 1997). این قبیل شواهد موجود در رابطه بین تکوین اندام‌های حرکتی و گنادها (Manning et al., 1998) را به این فرضیه رساند که هورمون‌های جنسی ممکن است به صورت علت و معلولی مرتبط با متغیرهای درون و بین جنسی در نسبت انگشتان باشد که ممکن است در نتیجه برهم کنش بین بیان ژن‌های هاکس و تولید استروئیدهای جنسی (تستیترون و استرادیول) طی دوران جنینی باشد. تحت این فرضیه و بررسی وسیع برهم کنش‌های هورمون‌های جنسی با رفتار و ویژگی‌های مرتبط با شایستگی موجود، مطالعات وسیع و گسترده‌ای در ارتباط با بررسی رابطه بین گرایشات جنسی، عملکرد، سلامت فردی و دیگر ویژگی‌های شایستگی موجود و نسبت طول انگشتان در هر دوی جنس‌های نر و ماده در انسان و دیگر مهره داران صورت گرفته است (Bailey & Hurd, 2005; Fink et al., 2005; Flegr et al., 2005; Kempel et al., 2005; Romano et al., 2006; Manning, 2002; Putz et al., 2004). اکثر این مطالعات، رابطه قوی‌تری بین این نسبت‌ها در دست راست نسبت به دست چپ گزارش داده‌اند که نشان دهنده یک تقارن جهت دار در حساسیت اندام‌های حرکتی به هورمون‌های جنسی بوده که مصدقه بارز آن نسبت پایین‌تر 2D:4D در سمت راست در مقایسه با سمت چپ در بسیاری از مطالعات انسانی و همچنین در موش‌ها است (Williams et al., 2002a, b; Brown et al., 2002a, b; Manning et al., 2002). ژن‌های هاکس از لحاظ تکاملی در رده مهره داران بشدت محافظت شده است 2D:4D در تقریباً تمامی گروه‌های مهره دارن چهارپا از جمله مارمولک‌ها، پرنده‌گان و پستانداران صورت گرفته است. برخی از این موارد شامل فنج راه راه گونه (*Taenopygia guttata*) که در آن نرها نسبت 2D:4D بالاتری در پای راست در مقایسه با ماده‌ها دارا بوده‌اند (Burley & Foster, 2004) و نیز گونه جنسی جنینی (*Phasianus colchicus*) که در آن دوشکلی جنسی در هیچ

مقدمه

دوشکلی جنسی در نسبت طول انگشتان دست‌ها و پاها بویژه در نسبت طول انگشتان دوم به چهارم دست‌ها در انسان‌ها بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است که در آن افراد نر دارای نسبت‌های پایین‌تر 2D:4D نسبت به افراد ماده هستند (Manning, 2002; Peters et al., 2002). این قبیل از دوشکلی‌های جنسی در ابتدای مراحل جنبی شکل گرفته و تا مراحل انتهایی رشد، در موجودات ثبت می‌شود (McIntyre et al., 2005; Trivers et al., 2006) نسبت طول انگشتان همچنین در دیگر جفت انگشتان اندام‌های جلویی یا دست‌ها و اندام‌های عقبی یا پاها (2D:3D, 2D:5D, 3D:4D) در دیگر گروه‌های مهره‌داران بررسی شده است که عموماً نرها مقادیر بالاتری نسبت به ماده‌ها نشان داده‌اند (McFadden & Shubel, 2002; Manning et al., 2003). بعلاوه، تقارن جهت دار در نسبت 2D:4D در بسیاری از مطالعات در انسان‌ها در زنان و مردان بررسی شده و دست راست دارای نسبت‌های پایین‌تری نسبت به دست چپ بوده و تقارن جهت دار در مردها نسبت به زن‌ها بالاتر است (Williams et al., 2000; Manning, 2002). همچنین نرها دارای نسبت‌های پایین‌تر در بین انگشتان 2D, 3D, 4D در موش‌های وحشی و آزمایشگاهی بودند (Brown et al., 2002a; Manning et al., 2003; Leoni et al., 2005; Bailey et al., 2005) در حالی که الگوهای متغیر تفاوت‌های جنسی در انگشتان (2D:4D) در نخستین غیر انسان نشان داده است که نرها دارای مقادیر پایین‌تری نسبت به ماده‌ها هستند (در بابون *Papio hamadryas*)، اما در بابون‌های گینه‌ای (*Papio papio*) گوریل‌ها (*Gorilla gorilla*) و شامپانزه‌ها (*Pan troglodytes*) نرها دارای نسبت بالاتری هستند (McFadden & Bracht, 2003, 2005; Roney et al., 2004). اگرچه بررسی‌های موسکافانه‌تر از لحاظ نشانه‌های تفاوت‌های جنسی برحسب نسبت‌های مختلف انگشتان ممکن است تفاوت‌های دیگری را آشکار کند.

تکوین اندام‌های حرکتی در مهره داران تحت کنترل یک سری از ژن‌های هاکس (HoxA, HoxD) بوده که در جوانه‌های جنسی جنینی (پیش ساخت اندام‌های جنسی) در طی تکوین

بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه و نمونه‌های وزغ پابیلچه‌ای در محدوده روستای گالش کلام (4118430N; 433536E; 39S) از توابع شهرستان لنگرود جمع آوری گردید. تعیین جنسیت افراد نر و ماده با استفاده از وجود سطوح پینه بسته در کف دستهای نمونه‌ها تعیین گردید به طوریکه نرها دراری سطوح پینه بسته بر روی انگشت شست بودند. همچنین بدلیل جمع آوری این وزغ‌ها در فضول تولید مثل نرها دراری بدنی کشیده و کوچکتر و ماده‌ها دارای بدن حجیم، بزرگتر و بر از تخم بودند. اندازه گیری‌ها در محیط انجام گرفت و نمونه‌ها بعد از اندازه گیری بلا فاصله آزاد شدند. در این مطالعه فقط افراد بالغ مورد بررسی قرار گرفتند. طول بدن (از پوزه تا انتهای مخرج) (SVL) به همراه طول انگشتان دست و پا در کلیه نمونه‌ها با استفاده دستگاه کولیس دیجیتال با دقیق ۰/۱ میلی‌متر اندازه گیری شد. با توجه به تأکید بر انگشتان دوم الی چهارم در این قبیل مطالعات، صرفاً انگشتان شماره II الی IV در سمت چپ بدن جهت انجام آنالیزها مورد استفاده قرار گرفتند. نرمال بودن داده‌ها با استفاده از تست Shapiro-Wilk (P>0.05) بررسی شد. مقایسه میانگین‌ها و معنی‌دار بودن تفاوت‌ها با استفاده از آزمون t برای نمونه‌های مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) صورت گرفت. تمامی سطوح معنی‌دار در سطح ۰/۰۵ در نظر گرفته شدند. به منظور بررسی و تعیین اثر اندازه بدن، جنسیت و برهم کنش بین اندازه و جنسیت بر روی اندازه نسبت طول انگشتان 2D:4D از MANOVA چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.

نتایج

نتیجه آزمون Shapiro-Wilk نشان داد که برای صفات مورد بررسی سطح معنی‌داری آن‌ها بیشتر از ۰/۰۵ بوده و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن داده‌ها پذیرفته شد. بنابراین می‌توان توزیع داده‌ها را برای این صفات با اطمینان بالایی نرمال فرض کرد. در این مطالعه تماماً نمونه‌های بالغ مورد استفاده قرار گرفتند. اندازه طول بدن در گونه *Bufo viridis* در محدوده ۳/۶۰-۷/۷۰ (۵/۰±۸/۰/۹۲۶) و در گونه *Pelobates syriacus* در محدوده ۶/۸-۴۰/۶۰ (۰/۰±۸۰/۹۲۶) ماده‌ها دارای میانگین طول بدن (SVL) بیشتری نسبت به نرها بودند و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (۸/۱۲) در مقابل ۷/۱۴ و P=۰/۰۱. در گونه *Bufo viridis* نیز ماده‌ها دارای میانگین طول بدن بیشتری از نرها بودند اما این اختلاف بین افراد نر و ماده از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (شکل ۳).

کدام از نسبت‌های انگشتان در هر دو پا مشاهده نشده است (Romano et al., 2005). ارتباط بین اکولوژی و مورفولوژی در بسیاری از تاکسونهای جانوری مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط بین طول نسبی انگشتان و ویژگی‌های زیستگاهی گونه بسیار محتمل است که نشان دهنده این است در برخی گونه‌ها مورفولوژی پاها و یا دستها مرتبط با عملکرد حرکتی گونه در محیط‌های اکولوژیکی مختلف است. مطالعات مشابهی در لاسرتای شکم سبز گونه *Darevskia cholorogaster* در شمال ایران توسط Noghanchi & Javanbakht (2019) صورت گرفته که اظهار داشتند این نسبت‌ها در گونه مورد بررسی ممکن است علاوه بر پایه ژنتیکی و هورمونی ارائه شده برای پستانداران و دیگر گروه‌های مهر داران، با ویژگی‌های زیستگاهی گونه نیز مرتبط باشد. همچنین بررسی دوشکلی *Pelophylax ridibundus* جنسی در گونه قورباغه مردابی در شمال ایران توسط Rajabi & Javanbakht (2019) نشان از وجود تفاوت‌های معنی‌دار در اندازه انگشتان اول و سوم (1D:3D) بین دو جنس نر و ماده بوده است.

وزغ پابیلچه ای *Pelobates syriacus* Boettger, 1889 گونه‌ای از وزغ‌های خانواده Pelobatida است که از قسمت‌های شرقی شبه جزیره بالکان و شرق دریای سیاه تا شمال ایران و آسیای صغیر و قفقاز پراکنی دارد. این وزغ در مناطق جنگلی، استپی و نیمه بیابانی زیست می‌کند. در کف پای این وزغ توبرکول پشتی توسعه یافته و شبیه بیلچه شده است که وجه تسمیه نام این وزغ است. وزغ سبز *Bufo viridis* گونه‌ای وزغ از خانواده Bufonidae است که در نواحی استپ و کوهستانی، بیابانی، جنگلی و حاشیه شهرها با پراکنی وسیع حضور دارد. این وزغ در اغلب استان‌های ایران دیده شده است. در این مطالعه، تغییرات مرتبط با جنسیت در نسبت‌های 2D:3D, 2D:4D, 3D:4D سمت چپ دو گونه از وزغ‌های ایران شامل وزغ پابیلچه ای و وزغ سبز بر اساس اندازه گیری کلیه انگشتان دست و پا مورد بررسی قرار گرفته است.


مواد و روش‌ها

در این مطالعه ۵۴ نمونه از وزغ‌ها متشکل از وزغ سبز *Bufo viridis* (۱۶ نمونه نر و ۱۹ نمونه ماده) و وزغ پابیلچه‌ای *Pelobates syriacus* (۱۰ نمونه نر و ۹ نمونه ماده) در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱). نمونه‌های وزغ سبز از محدوده روستای دهکا (4137047N; 417443E; 39S) از توابع



شکل ۱- تصاویر وزغ‌های بررسی شده در این مطالعه. A. وزغ سبز اروپایی (*Bufo viridis*). B. وزغ پابیله‌ای (*Pelobates syriacus*)

Fig. 1. Photographs of toads investigated in this study. A. European green toad (*Bufo viridis*). B. Eastern spadefoot toad (*Pelobates syriacus*).



شکل ۲- نمودار باکس پلات افراد نر و ماده دو گونه مورد بررسی از لحاظ ویژگی اندازه بدن.

Fig. 2. Box plot graph of male and female specimens in two examined species based on snout-vent length (SVL).

جدول ۱- تفاوت‌های جنسی اندام‌های حرکتی جلو و عقب سمت چپ در دو گونه مورد بررسی F-tests و Levene t-tests مربوط به تست چپ در دو گونه مورد بررسی. اثر اندازه (Cohen's d) محاسبه شده برای هر دو جفت صفت مورد بررسی توسط dmean و dvar صورت گرفته است.

Table 1. Summary of sex-related differences in left fore and hind limb in two examined species. F-tests refer to the Levene's test for the equality of variances, whereas the t-tests refer to sex differences. Effect sizes (Cohen's d) are calculated for each of these two tests (dvar and dmean, respectively).

Measure	Males (N=16)	Females (N=19)	F	d _{var}	t	p	d _{mean}
Forelimb							
<i>Bufo viridis</i>	2D:3D	0.8200	0.7879	0.804	1	-1.418	0.376
	2D:4D	1.1538	1.1203	0.237	1	-3.142	0.630
	3D:4D	1.4081	1.4223	0.059	1	-1.112	0.809
Hind limb							
	2D:3D	0.6603	0.6106	1.983	1	-0.714	0.168
	2D:4D	0.4055	0.3680	2.909	1	0.417	0.097
	3D:4D	0.6241	0.6147	0.060	1	1.854	0.814
 Forelimb							
<i>Pelobates syriacus</i>	2D:3D	0.7404	0.7147	0.444	1	-1.214	0.514
	2D:4D	1.0659	0.9940	2.879	1	-2.941	0.108
	3D:4D	1.4701	1.3904	0.675	1	-1.004	0.423
Hind limb							
	2D:3D	0.6429	0.7149	1.721	1	-1.714	0.207
	2D:4D	0.5033	0.4481	4.932	1	0.821	0.040
	3D:4D	0.6956	0.7187	0.603	1	1.252	0.448

جنسی انگشتان در یک گونه دوزیست اگر وجود داشته باشد و طبق الگوی بدست آمده در دیاپسیدها اگر نسبت 2D:4D در نرها بیشتر از ماده‌ها باشد میتوان طبق مطالعات پیشین در این زمینه اظهار کرد که دوشکلی جنسی در این صفت ممکن است حالت اجدادی در گونه مورد بررسی باشد.

طبق فرضیه‌های ارائه شده در این خصوص، نسبت طول انگشت دوم به چهارم (2D:4D) مهمترین عامل تفاوت‌های مورفولوژیکی این صفت در گروه‌های مختلف جانوری بوده که در بعضی گروه‌ها نرها نسبت‌های بالاتری دارند و در برخی گروه‌ها ماده‌ها نسبت بالاتری دارند. دوشکلی جنسی انگشتان همچنین در انگشتان شماره ۳ و ۴ هم دیده شده‌اند. در برخی گروه‌های جانوری انگشتان دست این ویژگی دوشکلی جنسی را بهتر نشان می‌دهند، در برخی گونه‌ها دوشکلی جنسی بیشتر توسط انگشتان پاها نشان داده می‌شوند. در برخی موارد نیز هر دوی انگشتان دست و پا ممکن است نتایج متفاوتی را ارائه بدهند. نسبت 2D:4D به عنوان یک صفت مهمی در بررسی دوشکلی جنسی مهره داران می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این قبیل از مطالعات در گونه‌ها و تاکسون‌های جانوری مختلف بندرت صورت گرفته است و مطالعه حاضر می‌تواند شواهد کامل‌تر و بهتری از

نسبت اندازه طول انگشتان دست و پا در سمت چپ بدن برای هر دو گونه از لحاظ (2D:3D, 2D:4D, 3D:4D) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هیچ کدام از صفات مورد بررسی در اندام‌های حرکتی جلویی و عقبی اختلاف معنی‌داری بین افراد نر و ماده در گونه *Bufo viridis* مشاهده نشد. اما از لحاظ 2D:4D بین افراد نر (۰/۵۰۳۳) و ماده (۰/۴۴۸۱) در گونه *Pelobates syriacus* اختلاف معنی‌دار (P=۰/۰۴۰) در انگشتان دوم و چهارم اندام‌های عقبی وجود داشت (شکل ۳). جزئیات بیشتر این مقادیر در جدول ۱ ارائه شده است.

بحث

در این مطالعه دوشکلی جنسی در نسبت طول انگشتان دست و پا در سمت چپ بدن در گونه‌های *Pelobates* و *Bufo viridis* در اندازه بدن دوشکلی جنسی در انگشتان طول *Bufo viridis* از لحاظ اندازه بدن افراد نر و ماده قادر دوشکلی جنسی معنی‌دار از لحاظ آماری بودند. اما دوشکلی جنسی در اندازه طول *Pelobates syriacus* مشاهده شد. اما در گونه *Pelobates syriacus* از لحاظ اندازه بدن افراد نر و ماده قادر دوشکلی جنسی معنی‌دار از لحاظ آماری بودند. اما دوشکلی جنسی در اندازه طول *Pelobates syriacus* صرفا در نسبت 2D:4D مشاهده گردید. اهمیت این مطالعه در این است که طبق مطالعات (Chang 2006) الگوی دوشکلی

تعداد انگشتان در اندام‌های جلویی در دوزیستان میتواند مسئول این کاهش نسبت در انگشتان دوم و چهارم و در نتیجه فقدان دوشکلی جنسی در این اندام باشد (Chang, 2008).


دوشكلى جنسى در ميان ديار دوزيستان بررسى شده در ايران، تغييرات درون جمعيتي و درون گونه‌اي از لحظه اين نسبت‌ها در ميان نمونه‌های بررسى شده مشاهده شده است (Rajabi & Javanbakht, 2019). اما، الگوی دوشکلی جنسی در نسبت طول انگشتان در دو گونه مورد بررسی در اين مطالعه مشابه بود. بنابراین پيش بينی و تعليم الگوی ثابت و معينی در ميان دوزیستان از اين لحظه، تا حدودی مشکل و غير ممکن است. الگوهای مشابه در تفاوت‌های جنسی در نسبت‌های مشاهده شده طول انگشتان در دو گونه مورد بررسی نشان دهنده الگوهای مشابه دوشکلی جنسی اندازه بوده و ممکن است به معنی وجود يك مكانيسم اساسی مشترک شكل دهنده دوشکلی جنسی در هر دوي ويژگی‌های بدنه و نسبت‌های انگشتان در اين گونه‌ها باشد. در مهره‌داران، مراحل رشد دوشکلی جنسی بستگی به بيان

وضعیت دوشکلی جنسی در دوزیستان ارائه بدهد و اطلاعات موجود در این زمینه را بهبود بخشد. نسبت‌های بالای 2D:4D در گونه *Pelobates syriacus* در افراد نر نسبت به افراد ماده، موافق و هماهنگ با بيشتر گونه‌های مهره داران از جمله فرج راه Saino et al., (Burley & Foster, 2004)، مرغ بهشتی (Rubolini et al., 2007)، مارمولک‌های جنس *Podarcis* (Chang et al., 2006) و *Anolis* (2006) در نسبت 2D:4D در اندام‌های جلویی و عقیبي گونه *Bufo viridis* می‌تواند به دليل پايين بودن دامنه تغييرات پايين در اندازه نسبت اين دو انگشتان در هر دوي اندام‌های جلویی و عقیبي گونه *Bufo viridis* و در اندام‌های جلویی گونه *Pelobates syriacus* باشد (شکل ۳). اگرچه مكانيسم‌های تکويني که مسئول اين اختلافات و عدم وجود تفاوت‌های جنسی در اين نسبت‌ها به خصوص در اندام‌های جلویی باشد کاملاً مشخص نیست، اما اين امكان وجود دارد که مكانيسم کاهش

جدول ۲- اثر اندازه، طول بدنه، جنسیت و برهمه کنش آن‌ها بر روی نسبت طول انگشتان 3D: 2D: 4D و 3D: 2D: 4D و 3D: 2D: 4D در اندام‌های جلویی و عقیبي (سمت چپ) در دو گونه مورد بررسی.

Table 2. The effect of sex, snout–vent length (SVL), and their interaction on the digit ratios 2D: 4D, 3D: 4D and 2D: 3D of the left fore and hind limb in two examined species.

	2D:3D			2D:4D			3D:4D		
	Forelimb	df	F-ratio	P	df	F-ratio	P	df	F-ratio
<i>Bufo viridis</i>	Factor								
	Sex	1	1.906	0.261	1	8.731	0.060	1	0.018
	SVL	1	0.993	0.594	1	8.792	0.049	1	2.061
	SVL by Sex	1	2.973	0.199	1	29.399	0.009	1	2.292
	2D:3D			2D:4D			3D:4D		
	Hind limb	df	F-ratio	P	df	F-ratio	P	df	F-ratio
	Factor								
	Sex	1	21.095	0.019	1	8.869	0.059	1	1.448
	SVL	1	15.574	0.022	1	1.382	0.453	1	2.143
	SVL by Sex	1	4.345	0.128	1	1.670	0.357	1	1.932
<i>Pelobates syriacus</i>	2D:3D			2D:4D			3D:4D		
	Forelimb	df	F-ratio	P	df	F-ratio	P	df	F-ratio
	Factor								
	Sex	1	2.108	0.345	1	7.234	0.120	1	0.124
	SVL	1	1.125	0.852	1	9.482	0.088	1	3.101
	SVL by Sex	1	2.802	0.288	1	27.988	0.007	1	1.857
	Hind limb	df	F-ratio	P	df	F-ratio	P	df	F-ratio
	Factor								
	Sex	1	24.194	0.411	1	8.701	0.157	1	2.221
	SVL	1	14.571	0.014	1	2.014	0.252	1	3.412
	SVL by Sex	1	5.741	0.412	1	2.410	0.427	1	2.254



شکل ۳- نمودار باکس پلات نسبت طول انگشتان دوم به چهارم (2D:4D) در انگشتان دست (A) و انگشتان پا (B) در دو گونه وزغ مورد بررسی. حرف F در محور عمودی نمودار (A) معرف اندام‌های جلویی (Fore Limbs)، حرف H در نمودار (B) معرف اندام‌های عقبی (Hind Limbs).

Fig. 3. Box plot diagram of the ratios of the length of the second to fourth digits (2D:4D) in the fingers (A) and toes (B) in two examined species of toads. The letter F in the vertical axis of the diagram represents the fingers of the front limbs (Fore Limbs), the letter H represents the hind limbs (Hind Limbs).

هیپوتالاموسی هورمون رشد، که باعث تنظیم آزادسازی و سنتز هژئن‌های مسئول در طی تکوین فردی دارد (Badyaev, 2002). در هورمون رشد می‌شود، تحت کنترل استروئیدهای جنسی است. هردوی آندروژن‌ها و استروژن‌ها می‌توانند ترشح هورمون رشد را تحریک کنند اما اهمیت نسبی آن‌ها می‌تواند در گونه‌های متفاوت مختص‌باشد (Badyaev, 2002).

هیپوتالاموسی هورمون رشد، که باعث تنظیم آزادسازی و سنتز هژئن‌های مسئول در طی تکوین فردی دارد (Badyaev, 2002). در هورمون رشد وابسته به جنس توسط تخصص یافته‌گی بالای جنسی در هورمون رشد (GH) ترشح و تکمیل می‌شود (Badyaev, 2002). در این رابطه، استروئیدهای جنسی نقش موثری را بازی می‌کنند. زیرا فاکتورهای مهار کننده و آزاد کننده مختلف باشند (Badyaev, 2002).

REFERENCES

- Badyaev, A.** 2002. Growing apart: an ontogenetic perspective on the evolution of sexual size dimorphism. *Trends in Ecology & Evolution* 17: 369-378.
- Bailey, A. & Hurd, L.** 2005. Finger length ratio (2D:4D) correlates with physical aggression in men but not in women. *Biological Psychology* 68: 215-222.
- Bailey, A., Wahlsten, D. & Hurd, P.** 2005. Digit ratio (2D:4D) and behavioral differences between inbred mouse strains. *Genes Brain and Behavior* 4: 318-323.
- Brown, W.M., Finn, C.J. & Breedlove, S.** 2002a. Sexual dimorphism in digit-length ratios of laboratory mice. *The Anatomical Record* 267: 231-234.
- Brown, W.M., Finn, C.J., Cooke, B.M. & Breedlove, S.M.** 2002b. Differences in finger length ratios between self-identified “butch” and “femme”. *Archives of Sexual Behavior* 31: 123-127.
- Burley, N. & Foster, V.** 2004. Digit ratio varies with sex, egg order and strength of mate preference in zebra finches. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 271: 239-244.
- Chang, J.L.** 2008. Sexual dimorphism of the second-to-fourth digit length ratio (2D:4D) in the strawberry poison dart frog (*Oophaga pumilio*) in Costa Rica. *Journal of Herpetology* 42: 414-416.
- Chang, J., Doughty, J., Wade, L. & Lovorn, M.** 2006. Sexual dimorphism in the second-to-fourth digit length ratio in Green Anoles, *Anolis carolinensis* (Squamata: Polychrotidae) from the southeastern United States. *Canadian Journal of Zoology* 84: 1489-1494.
- Fink, B., Grammer, K., Mitteroecker, P., Gunz, P., Schaefer, K., Bookstein, F. & Manning, J.** 2005. Second to fourth digit ratio and face shape. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 272: 1995-2001.
- Flegr, J., Hruskova, M., Hodny, Z., Novotna, M. & Hanusova, J.** 2005. Body height, body mass index, waist-hip ratio, fluctuating asymmetry and second to fourth digit ratio in subjects with latent toxoplasmosis. *Parasitology* 130: 621-628.
- Kempel, P., Gohlke, B., Klempau, J., Zinsberger, P., Reuter, M. & Hennig, J.** 2005. Second-to-fourth digit length, testosterone and spatial ability. *Intelligence* 33: 215-230.
- Kondo, T., Zakany, J., Innis, J. & Duboule, D.** 1997. Of fingers, toes and penises. *Nature* 390: 29.
- Krumlauf, R.** 1994. Hox genes in vertebrate development. *Cell* 78: 191-201.
- Leoni, B., Canova, L. & Saino, N.** 2005. Sexual dimorphism in metapodial and phalanges length ratios in the wood mouse. *The Anatomical Record Part A Discoveries in Molecular Cellular and Evolutionary Biology* 286A: 955-961.
- McFadden, D. & Shubel, E.** 2002. Relative lengths of finger and toes in human males and females. *Hormones and Behavior* 42: 492-500.
- McFadden, D. & Bracht, M.** 2003. The relative lengths and weights of metacarpals and metatarsals in baboons (*Papio hamadryas*). *Hormones and Behavior* 43: 347-355.

در نهایت به طور خلاصه، نسبت 2D:4D در گونه *Pelobates syriacus* (در اندامهای عقبی) دارای دوشقکلی جنسی بوده و این نتایج، پیرو بک الگوی مشابه در دیاپسیدها (و نه سیناپسیدها) بوده که در آن نسبت این انگشتان در نرها نسبت به ماده‌ها بالاتر است. اما جهت بررسی صحت و تعمیم این الگو در دیگر دوزیستان و مهره داران، لازم است تا نسبت 2D:4D در تعداد گونه‌های بیشتری از مهره داران مورد بررسی قرار گیرد.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله از مسئولین موزه و آزمایشگاه گروه زیست‌شناسی دانشگاه گیلان کمال تشکر و سپاسگزاری را دارند.

- McFadden, D. & Bracht, M.** 2005. Sex differences in the relative lengths of metacarpals and metatarsals in gorillas and chimpanzees. *Hormones and Behavior* 47: 99-111.
- McIntyre, M., Ellison, P., Lieberman, D., Demerath, E. & Towne, B.** 2005. The development of sex differences in digital formula from infancy in the Fels longitudinal study. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 272: 1473-1479.
- Manning, J.** 2002. *Digit ratio*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Manning, J., Scutt, D., Wilson, J. & Lewis-Jones, D.** 1998. The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm number and levels of testosterone, LH and oestrogen. *Human Reproduction* 13: 3000-3004.
- Manning, J., Callow, M. & Bundred, P.** 2003. Finger and toes ratios in humans and mice: implications for the etiology of diseases influenced by HOX genes. *Medical Hypotheses* 60: 340-343.
- Mortlock, D. & Innis, J.** 1997. Mutation of HOXA13 in hand-foot genital syndrome. *Nature Genetics* 15: 179-180.
- Noghanchi, E. & Javanbakht, H.** 2019. Study of Sexual Dimorphism in Second-to-Fourth Digit Length Ratio (2D: 4D) in the Green-Bellied Lizard (*Darevskia chlorogaster*) from Iran. *Journal of Genetic Resources* 5: 45-50.
- Peters, M., Mackenzie, K. & Bryden, P.** 2002. Finger length and distal finger extent patterns in human. *American Journal of Physical Anthropology* 117: 209-217.
- Rajabi, F. & Javanbakht, H.** 2019. Sexual Dimorphism in Digit Length Ratios in Marsh Frog, *Pelophylax ridibundus* (Ranidae) from Iran. *Journal of Applied Biological Sciences* 13: 33-36.
- Utz, D., Gaulin, S., Sporter, R. & McBurney, D.** 2004. Sex hormones and finger length. What does 2D:4D indicate? *Evolution and Human Behavior* 25: 182-199.
- Romano, M., Rubolini, D., Martinelli, R., Bonisoli, A. & Saino, N.** 2005. Experimental manipulation of yolk testosterone affects digit length ratios in the ring-necked pheasant (*Phasianus colchicus*). *Hormones and Behavior* 48: 342-346.
- Romano, M., Leoni, B. & Saino, N.** 2006. Examination marks of male university students positively correlate with finger length ratios (2D:4D). *Biological Psychology* 71: 175-182.
- Roney, J., Whitham, J., Leoni, M., Bellem, A., Wielebnowski, N. & Maestripieri, D.** 2004. Relative digit lengths and testosterone levels in Guinea baboons. *Hormones and Behavior* 45: 285-290.
- Rubolini, D., Pupin, F., Sacchi, A., Gentilli, M., Zuffi, P., Galeotti, H. & Saino, N.** 2006. Sexual dimorphism in digit length ratios in two lizard species. *Anatomical Record* 288: 491-497.
- Trivers, R., Manning, J. & Jacobson, A.** 2006. A longitudinal study of digit ratio (2D:4D) and other finger ratios in Jamaican children. *Hormones and Behavior* 49: 150-156.
- Williams, T., Pepitone, M., Christensen, S., Cooke, B., Huberman, A., Breedlove, N., Breedlove, T., Jordan, C. & Breedlove, S.** 2000. Finger-length ratios and sexual orientation. *Nature* 404: 455-456.

How to cite this article:

Alinezhadi, I., Heidari, N. & Javanbakht, H. 2020. Sexual dimorphism in digit length ratios of the second to fourth digits (2D:4D) in two species of green toads (*Pelobates syriacus* Boettger, 1889 and *Bufo viridis* (Laurenti, 1768)). *Nova Biologica Reperta* 7: 295-303. (In Persian).

علی‌نژادی، ا.، حیدری، ن. و جوان بخت، م. ۱۳۹۹. بررسی دوشکلی جنسی در نسبت طول انگشتان دوم تا چهارم (2D:4D) در دو گونه وزغ سبز و وزغ پابیله‌ای. *یافته‌های نوین در علوم زیستی* ۷: ۲۹۵-۳۰۳.