

معرفی گونه‌های گیاهی درختی و درختچه‌ای بخش مرکزی شهرستان زنجان

زهره طغرانگار و مهناز وفادار

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
vafadar@znu.ac.ir
ستخوان مکاتبات: مهناز وفادار، ir

چکیده. مطالعه فلوریستیکی از موثرترین روش‌ها برای آگاهی از ظرفیت‌های زیستی و نیز مدیریت و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی در سیستم‌های اکولوژیکی است. شهرستان زنجان منطقه‌ای کوهستانی با وسعتی برابر ۶۷۶۳ کیلومترمربع و با میانگین ارتفاع ۱۶۶۳ متر از سطح دریا است. مناسب بودن شرایط بوم‌شناسخی، رویشگاه‌های متنوع و منابع آبی مناسب دلیل تنوع مطلوب پوشش گیاهی در این شهرستان است. برای بازنمایی تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای چوبی در این شهرستان، بخش مرکزی آن با وسعت 2600.2 کیلومترمربع انتخاب شد. بهمنظور شناسایی گونه‌های گیاهی درختی و درختچه‌ای، بررسی شکل رویشی و کورولوژی این گیاهان، نمونه‌های درختی و درختچه‌ای این منطقه با روش مرسوم مطالعات فلوریستیک جمع‌آوری و با استفاده از منابع معتبر آرایه‌شناسی گیاهی شناسایی شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۱۲۲ گونه درختی و درختچه‌ای چوبی متعلق به ۷۶ سرده و ۳۹ تیره گیاهی وجود دارد. تیره‌های گل‌سرخیان با ۲۹ گونه و زیتونیان با ۹ گونه در مجموع $31/15$ درصد از کل گونه‌ها را شامل می‌شوند. مزوفاروفیت‌ها ($37/7$) و میکروفافاروفیت‌ها ($32/79$) درصد) شکل‌های زیستی غالب منطقه به روش رانکیه هستند. عناصر رویشی ایرانی- تورانی از مهم‌ترین گروه‌های کورولوژیک موجود در منطقه بر اساس دیدگاه زهری بوده است. در منطقه مورد مطالعه، *Prunus lycioides* به عنوان یکی از گونه‌های انحصاری ایران شناسایی گردید.

واژه‌های کلیدی. شکل زیستی، درختان، درختچه‌ها، عناصر رویشی، مطالعه فلوریستیک

The introduction of tree and shrub species in the central district of Zanjan county town

Zohreh Tohranegar & Mahnaz Vafadar

Department of Biology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran
Correspondent author: Mahnaz Vafadar, vafadar@znu.ac.ir

Abstract. Floristic study is one of the most efficient methods of gaining knowledge about biological capacities, as well as management and conservation of plant genetic resources in ecological systems. Zanjan county town is located in a mountainous region with an area of 6763 km^2 and the average altitude of 1663 m.a.s.l. Its favorable vegetation diversity is the result of suitable ecological conditions, diverse habitats and appropriate water resources in the region. The central district of Zanjan county town, with an area of 2600.2 km^2 , was chosen as a representative to show tree and woody shrub species diversity. In order to identify tree and shrub species, life forms and chorology of plants, samples were collected by the conventional method of floristic studies and were, then, identified using taxonomic references. In total, there were 122 tree and woody shrub species, belonging to 76 genera and 39 families, in the studied area. The richest families included Rosaceae (29 species) and Oleaceae (9 species), which comprised 31.15% of the arboreal and woody shrub species. Mesophanerophytes (37.7%) and microphanerophytes (32.79%) were the dominant life forms in the area studied as determined by the Raunkiaer method. The Irano-Turanian vegetative elements were the most important elements in this area based on Zohary approach. *Prunus lycioides* was found to be endemic to Iran.

Keywords. floristic study, life form, shrubs, trees, vegetative elements

مقدمه

2004). به منظور معرفی مجموعه گیاهان درختی و درختچه‌ای پرديس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، پژوهشی انجام شد. بر اساس یافته‌های حاصل از این تحقیق ۸۸ گونه درخت و درختچه در این پرديس موجود هستند (Pahlavani et al., 2017). نتایج پژوهش صورت گرفته در خصوص تنوع درختان و درختچه‌های منطقه مارمیشو در استان آذربایجان غربی، وجود ۴۷ گونه متعلق به ۱۸ تیره را در این منطقه آشکار ساخت (Larti et al., 2011). در پژوهش دیگری، گونه‌های درختی و درختچه‌ای جنگل‌های منطقه میان‌تنگ سیروان استان ایلام و جنگل‌های بلوط هیانان ایلام مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع ۱۱ و ۶ گونه درختی در این جنگل‌ها معرفی شدند (Hosseini, 2014, 2016). بررسی تنوع گونه‌های درختی و درختچه‌ای بیشه‌زارهای گویجه‌بلدر شهرستان اهر حاکی از حضور ۱۳ گونه چوبی در این منطقه است (Ghanbari & Shaidai, 2018). همچنین بررسی تنوع گونه‌ای ذخیره‌گاه جنگلی افرا تخته گرگان، حضور ۹۰ گونه شامل ۳۲ گونه درختی و ۵۸ گونه علفی را در این منطقه نشان داده است (Esmailzadeh et al., 2012).

گیاهی استان زنجان نیز بیانگر وجود حدود ۱۱۰۸ گونه گیاهی در این منطقه از شمال غرب کشور است (Mousavi, 2000). بررسی پوشش گیاهی این منطقه به صورت محلی جهت دستیابی به اطلاعاتی برای درک بهتر مسائل اکولوژیکی و شناسایی ظرفیت‌های آن مانند گونه‌های نادر، دارویی، غذایی و صنعتی و همچنین تهدیدهای موجود همچون گونه‌های در حال انقراض ضروری است. چنین بررسی‌هایی در حفاظت از منابع و اکوسیستم‌های طبیعی و در توسعه پایدار نقش موثری دارند. کشور پهناور ایران نیز به دلیل تنوع وسیع اقلیمی، توبوگرافی، پیشینه تاریخی زیستی، پتانسیل بالای گونه‌زایی و دارا بودن چهار منطقه چهارگیاهی مهم ایرانی-تورانی، اروپا-سیری، صحرا-عربستان و سودانی که در مجموع بستر مساعدی را جهت تنوع گیاهی ایجاد کرده، موضوع مطالعات فلورستیک، پوشش و چهارگیاهی متعددی قرار گرفته است (Nejadhabibvash et al., 2016; Zohary, 1973).

مواد و روش‌ها

ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه: شهرستان زنجان در مرکز استان زنجان در محدوده چهارگیاهی ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه عرض شمالی واقع شده است و مساحت آن ۶۷۶۲ کیلومتر مربع است. این شهرستان از شمال به استان آذربایجان شرقی، از شمال شرق به شهرستان طارم، از شرق به شهرستان سلطانیه و ابه، از جنوب به شهرستان ایجرود و خدابنده، از غرب به شهرستان

شناسایی و حفاظت از پوشش گیاهی و تنوع گونه‌ای هر منطقه، به سبب کارکرد آن در چرخه غذایی، جلوگیری از فرسایش خاک و احیاء محیط، از اولویت‌های زیست محیطی بهشمار می‌آید (Proenca et al., 2017). تنوع گونه‌ای یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تنوع زیستی بوده (Hui & Pommerening, 2014) و تنوع گونه‌ای بالا در یک منطقه بهمنزله پایداری اکولوژیکی بیشتر است و عامل تکمیل و طولانی تر شدن زنجیره‌های غذایی و افزایش خودتنظیمی محیط به حساب می‌آید (Krebs, 2001) که نابودی هر یک از آن‌ها باعث به هم خوردن تعادل حیاتی طبیعت می‌شود (Proenca et al., 2017). یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع طبیعی، حفظ تنوع گیاهی در اکوسیستم در سه سطح درختی، درختچه‌ای و علفی است (Hosseini, 2016). درختان و درختچه‌ها به عنوان عناصر بالرزش گیاهی علاوه بر مشمره‌بودن، از کاربردهای متنوع زیستی، دارویی و غذایی برخوردار هستند و در ایجاد فضای سبز، تلطیف هوا، تعدیل آب و هوای منطقه و کنترل اقلیمی، جلوگیری از فرسایش خاک، احیا محیط، جذب پرتوها و کاهش آلودگی‌های صوتی نقش دارند (Momen Roomany, 2000).

بررسی پوشش گیاهی یک منطقه به صورت محلی جهت دستیابی به اطلاعاتی برای درک بهتر مسائل اکولوژیکی و شناسایی ظرفیت‌های آن مانند گونه‌های نادر، دارویی، غذایی و صنعتی و همچنین تهدیدهای موجود همچون گونه‌های در حال انقراض ضروری است. چنین بررسی‌هایی در حفاظت از منابع و اکوسیستم‌های طبیعی و در توسعه پایدار نقش موثری دارند. کشور پهناور ایران نیز به دلیل تنوع وسیع اقلیمی، توبوگرافی، پیشینه تاریخی زیستی، پتانسیل بالای گونه‌زایی و دارا بودن چهار منطقه چهارگیاهی مهم ایرانی-تورانی، اروپا-سیری، صحرا-عربستان و سودانی که در مجموع بستر مساعدی را جهت تنوع گیاهی ایجاد کرده، موضوع مطالعات فلورستیک، پوشش و چهارگیاهی متعددی قرار گرفته است (Pahlavani et al., 2017).

مطالعات مختلفی پیرامون معرفی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در مناطق مختلف کشور انجام شده است. تعداد گونه‌های درختان و درختچه‌های ایران (اعم از خودرو و کاشته شده)، ۹۵۶ گونه در قالب ۳۲۹ سرده است (Mozaffarian,

هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه زنجان نگهداری می‌شوند. این نمونه‌ها با شماره هرباریومی ۱۳۱۱ تا ۱۴۳۳ مخصوص شده‌اند. تعیین شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی: کوروتیپ نمونه‌های جمع‌آوری شده از این منطقه با توجه به پراکنش جغرافیایی گیاهان Zohary, 1973; Javanshir, 1976; Takhtajan, 1986; Mozaffarian, 2004; Yusefi, 2006). اشکال زیستی نمونه‌های درختی و درختچه‌ای براساس سیستم طبقه‌بندی رانکیه (Raunkiaer, 1934) مشخص شد.


ماهن Shan و از شمال غرب به شهرستان میانه محدود می‌گردد (شکل ۱). از نظر توپوگرافی، منطقه‌ای کوهستانی است و در محدوده ارتفاعی ۱۲۱۰-۲۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. بر اساس آمارهای اقلیمی ۱۰ ساله ایستگاه سینوپتیک زنجان (۱۳۸۷-۱۳۹۶)، میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان ۲۷۸/۷ میلی‌متر است. حداکثر بارندگی در فروردین ماه به میزان ۵۱ میلی‌متر و حداقل آن در مردادماه به میزان ۴/۴ میلی‌متر گزارش شده است. رطوبت نسبی متوسط در این شهرستان ۵۵ درصد و متوسط دمای سالانه ۱۲/۵ درجه سانتی‌گراد است. حداکثر متوسط دمای ماهانه در مرداد ماه ۲۴/۴ درجه سانتی‌گراد و حداقل متوسط دمای ماهانه در دی ماه ۱/۱ درجه سانتی‌گراد است (شکل ۲). این منطقه دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد است. بر اساس طبقه‌بندی اقلیمی دومارت، اقلیم شهرستان زنجان نیمه خشک و سرد است (Golchin, 2007). این شهرستان از سه بخش مرکزی، قره پشتلو و زنجان‌رود تشکیل شده است. منطقه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان زنجان است که شامل شهر زنجان و دهستان‌های بناب، بوغدانکندی، تهم، زنجان‌رودبلا، معجزات و قلتوق است.

جمع‌آوری نمونه‌ها: در این پژوهش، پس از تعیین حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی (شکل ۱) و انجام بازدیدهای مکرر از منطقه، نمونه‌های درختی و درختچه‌ای این منطقه در طی سال‌های رویشی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با استفاده از روش پیمایش زمینی، یکی از روش‌های مرسوم مطالعات فلوریستیک، جمع‌آوری شد (جدول ۳) و پس از تهیه نمونه‌های هرباریومی استاندارد جهت شناسایی به هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه زنجان منتقل شد.

شناسایی و محل نگهداری نمونه‌های گیاهی: نمونه‌های درختی و درختچه‌ای با استفاده از منابع معتبر آرایه‌شناسی گیاهی از جمله: فلاورا ایرانیکا (Rechinger, 1963-2010)، فلاور ترکیه (Davis, 1988-1998)، فلاور ایران (Assadi et al., 1988-2013)، فلاور (Komarov, 1933-1964)، رده‌بندی گیاهی شوروی (Mozaffarian, 2000)، درختان و درختچه‌های ایران (Mozaffarian, 2004) و شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران (Mozaffarian, 2012) در حد گونه شناسایی شدند. تیره‌ها و سرده‌ها با سیستم طبقه‌بندی APG IV (APG, 2016) مطابقت داده شدند. درستی آخرین نام پذیرفته شده برای آرایه‌های گیاهی و اسامی اختصاری مولفان آرایه‌ها با استفاده از سایت‌های فعال و معتبر اینترنتی از جمله The plant list (2013) و نیز با نمایه بین المللی نام‌های گیاهی (IPNI, 2016) تطبیق و یکسان‌سازی شدند. نام‌گذاری فارسی گیاهان نیز بر اساس فرهنگ نام‌های گیاهان ایران (Mozaffarian, 1998) و درختان و درختچه‌های ایران (Mozaffarian, 2004) انجام شد. نمونه‌های شناسایی شده در


نتایج

نتایج حاصل از این پژوهش وجود ۱۲۲ گونه درختی و درختچه‌ای متعلق به ۷۶ سرده و ۳۹ تیره گیاهی را در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد، که از این تعداد ۲ گونه به نهان‌دانگان تک لپه‌ای‌ها، ۱۵ گونه به بازدانگان و ۱۰۵ گونه به نهان‌دانگان دولپه‌ای تعلق دارند. به این ترتیب بیشترین تعداد گونه‌ها متعلق به دولپه‌ای‌ها است (جدول ۱). از مجموع ۱۲۲ گونه گیاهی، ۳۸ گونه خودرو و ۸۴ گونه کاشته شده هستند. تیره‌های گل‌سرخیان (Rosaceae) با ۲۹ گونه و زیتونیان (Oleaceae) با ۹ گونه در مجموع ۳۱/۱۵ درصد از کل گونه‌ها را تشکیل داده و غنی‌ترین تیره‌های گیاهی در منطقه مورد مطالعه به حساب می‌آیند. تیره‌های بیدیان (Salicaceae) (۸ گونه)، کاجیان (Pinaceae) (۷ گونه)، باقلاییان (Fabaceae) (۶ گونه)، سرویان (Cupressaceae) (۵ گونه)، ناترکیان (Moraceae) (۵ گونه)، خرزه‌هایان (Apocynaceae) (۴ گونه) و شکریان (Sapindaceae) (۳ گونه) در رتبه‌های بعدی قرار دارند (شکل ۳). همچنین سرده‌های گونه در رتبه‌های بعدی بعده قرار دارند (شکل ۳). همچنین سرده‌های Berberis L. با ۱۱ گونه، Salix L. با ۵ گونه، Acer L. با ۱۱ گونه، Prunus L. با ۹/۸۴ درصد (۴۶ گونه) شکل زیستی غالب در منطقه هستند و پس از آن به ترتیب میکروفانروفیت‌ها با ۳۷/۷ درصد (۴۰ گونه)، نانوفانروفیت‌ها با ۱۹/۶۷ درصد (۲۴ گونه) و مکافانروفیت‌ها با ۹/۴ درصد (۱۲ گونه) قرار دارند (جدول ۲). عناصر رویشی ایرانی-تورانی با ۲۶ گونه (۲۱/۳۱ درصد) شکل ۵). از مهم‌ترین گروه‌های کوروولوزیک موجود در منطقه براساس روش زهری (Zohary, 1973) هستند. سایر مناطق فیتوجغرافیایی به ترتیب عبارتند از: ایرانو-تورانی/مديترانه‌ای با ۱۸ گونه (۱۳/۹۲ درصد)، اروپا-سيبری با ۱۷ گونه (۱۲/۹۲ درصد)، ایرانو-تورانی/مديترانه‌ای/اروپا-سيبری با ۱۴ گونه (۱۱/۴۷ درصد)، ایرانو-تورانی/اروپا-سيبری با ۱۳ گونه (۱۰/۶۵ درصد)، آسیای شرقی با ۱۱ گونه (۹/۰۲ درصد).



شکل ۱-بخش مرکزی شهرستان زنجان: موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان زنجان و ایران (اقتباس از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، مدیریت آبخیزداری).

Fig. 1. Central district of Zanjan county town: Location of the study area in Zanjan Province and Iran (Source: Agricultural Jihad Organization of Zanjan Province, Watershed management).




شکل ۲- منحنی آمبرو ترمیک شهرستان زنجان (طبق آمار ایستگاه هواشناسی زنجان طی دوره آماری ۱۳۹۶-۱۳۸۷).

Fig. 2. Ombothermic curve of Zanjan county town (According to the statistics of Zanjan weather station during the statistical period of 2008-2017).

جدول ۱- تعداد گونه های گروه های عمده گیاهی بخش مرکزی شهرستان زنجان.


Table 1. The number of species in major groups of plants in the central district of Zanjan county town.

گروه گونه	تعداد گونه	تعداد سرده	تعداد تیره	گروه های گیاهی
پا زندگان	۱۵	۷	۳	
نهاندانگان	۲	۲	۲	تکله
نهاندانگان	۱۰۵	۶۷	۳۴	دو پله
تعداد کل	۱۲۲	۷۶	۳۹	




شکل ۳-نموداربزرگترین تیره‌های گیاهی براساس تعداد سرده و گونه در بخش مرکزی شهرستان زنجان

Fig. 3. Largest plant families according to the number of genera and species in central district of Zanjan county town.




شکل ۴- نمودار بزرگترین سرده‌های گیاهی بر حسب تعداد گونه در بخش مرکزی شهرستان زنجان

Fig. 4. Largest genera according to the number of species in central district of Zanjan county town.




شکل ۵-درصدفرابوی ای شکل‌های زیستی گیاهان درختی و درختچه‌ای بخش مرکزی شهرستان زنجان. Mesoph=مزوفانروفیت، Microph=میکروفانروفیت، Nanoph=نانوفانروفیت، Megaph=مگافانروفیت.

Fig. 5. Frequency of life forms of tree and shrub species in central district of Zanjan county town. Mesoph=Mesophanerophytes, Microph=Microphanerophytes, Nanoph=Nanophanerophytes, Megaph=Megaphanerophytes.



شکل ۶- درصد فراوانی پراکنش جغرافیایی گونه‌های درختی و درختچه‌ای منطقه مرکزی شهرستان زنجان، IT= ایرانو-تورانی، IT-M= ایرانو-تورانی/ مدیترانه‌ای، ES= اروپا-سیبری، IT-ES= ایرانو-تورانی/ اروپا-سیبری، IT-ES-M= ایرانو-تورانی/ اروپا-سیبری/ مدیترانه‌ای، EA= آسیای شرقی، IT-SS= ایرانو-تورانی/ آسیای میان‌رودخانه‌ای، IT-M-SS= ایرانو-تورانی/ مدیترانه‌ای/ صحراء-سندي، M= آسیای شرقی، EA= آسیای میان‌رودخانه‌ای/ صحراء-سندي، IT-SA= ایرانو-تورانی/ آسیای جنوبی، SAm= آمریکای جنوبی، IT-ES-EA= ایرانو-تورانی/ اروپا-سیبری/ آسیای شرقی، IT-M-SA= ایرانو-تورانی/ آسیای جنوبی/ مدیترانه‌ای، WCh= غرب چین و IT-ES-SS= ایرانو-تورانی/ اروپا-سیبری/ صحراء-سندي.

Fig. 6. Frequency of geographical distribution of tree and shrub plant species in central district of Zanjan county town, IT= Iran-Turanian, IT-M= Iran-Turanian /Mediterranean, ES= Euro-Siberian, IT-ES= Irano-Turanian / Euro-Siberian, IT-ES-M= Irano-Turanian/ Euro-Siberian/ Mediterranean, EA= East Asia, IT-EA= Irano-Turanian/ East Asia, M= Mediterranean, IT-M-SS= Irano-Turanian/ Mediterranean/Sahara-Sendianan, IT-SS= Irano-Turanian/ Sahara-Sendianan, SA= South Asia, SAm= South America, IT-ES-EA= Irano-Turanian/ Euro-Siberian/ East Asia, IT-M-SA= Irano-Turanian/ Mediterranean/ South Asia, WCh= West China, IT-ES-SS= Irano-Turanian/ Euro-Siberian/ Sahara-Sendianan.



شکل ۷- درصد فراوانی موارد استفاده گونه‌های درختی و درختچه‌ای بخش مرکزی شهرستان زنجان

Fig. 7. Frequency of usages of tree and shrub plant species in central district of Zanjan county town.

جدول ۲- فهرست اسامی علمی گونه‌ها، فرم زیستی، پراکنش جغرافیایی، کاشته شده یا خودرو بودن و موارد استفاده درختان و درختچه‌های شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه از شهرستان زنجان.*کاشته شده: در منطقه مورد مطالعه

Table 2. List of scientific names of species and their life-form, geographical distribution, cultivated or wild plants, usages of tree and shrub plant species in the studied area in Zanjan county town, *Cultivated: in the studied area and other regions of the Country

ردیف	نام علمی	نام فارسی	نام محلی	فرم زیستی	پراکنش جغرافیایی	نوع رویش	موارد استفاده
آدوکساسه Adoxaceae							
۱	<i>Sambucus nigra</i> L.	انگور کوکی، آقطی سیاه، آقطی اروپایی	-	میکروفلاتروفیت	آروبا - سیبری، ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی - داروئی
۲	<i>Viburnum opulus</i> L.	بداغ، بداغ جنگلی	گرمه‌شو	میکروفلاتروفیت	آروبا - سیبری	کاشته شده	زینتی - داروئی
تاج خروسیان Amaranthaceae							
۳	<i>Atriplex canescens</i> (Pursh) Nutt.	سلمکی سفید، بوته شود سفید	-	نانوفلاروفیت	ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی، خوارکی - علوفه‌ای
۴	<i>Haloxylon persicum</i> Bunge ex Boiss. & Buhse	زرد تاغ	-	میکروفلاتروفیت	ایرانو - تورانی، صحرا - سندی	کاشته شده	زینتی
پسته‌ثیان Anacardiaceae							
۵	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	درخت پر	زیچ، زنج	میکروفلاتروفیت	آروبا - سیبری، ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی - داروئی
خرزه‌هایان Apocynaceae							
۶	<i>Nerium oleander</i> L.	خرزه‌هه		میکروفلاتروفیت	ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی - داروئی
۷	<i>Trachomitum venetum</i> Woodson	قیطانی		نانوفلاروفیت	آروبا - سیبری، ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی
۸	<i>Vincamajor</i> L.	بیچ تلگرافی معمولی		نانوفلاروفیت	آروبا - سیبری، ایرانو - تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی - داروئی
کاسنیان Asteraceae							
۹	<i>Yucca gloriosa</i> L.	زنگوله‌ای، بوكا		میکروفلاتروفیت	آروبا - سیبری	کاشته شده	زینتی - داروئی
آسفodelاسه Asphodelaceae							
۱۰	<i>Hemerocallis fulva</i> L.	زنبق رشتی		نانوفلاروفیت	ایرانو - تورانی، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - داروئی
کاسنیان Asteraceae							
۱۱	<i>Solidago nemoralis</i> Aiton	علف طلابی		نانوفلاروفیت	آروبا - سیبری	کاشته شده	زینتی
عشقه‌ثیان Araliaceae							
۱۲	<i>Hedera helix</i> L.	عشقه		مزوفلاروفیت	آروبا - سیبری، ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی - داروئی
۱۳	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Hayata ex Merr.	شفلرا		میکروفلاتروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
مطبق‌کاجیان Araucariaceae							
۱۴	<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	اروکاریا	-	مزوفلاروفیت	آمریکای جنوبی	کاشته شده	زینتی
۱۵	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	کاج مطبق	-	مگافلاروفیت	آروبا - سیبری	کاشته شده	زینتی
زرشکیان Berberidaceae							
۱۶	<i>Berberis integerrima</i> Bunge	زرشك زرافشانی	زروش، زریش	میکروفلاتروفیت	ایرانو - تورانی	خودرو	زینتی - داروئی
۱۷	<i>Berberis × ottawensis</i> C.K.Schneid.	زرشك	-	نانوفلاروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - برجن
۱۸	<i>Berberis vulgaris</i> L.	زرشك	-	میکروفلاتروفیت	آروبا - سیبری، ایرانو - تورانی	کاشته شده	زینتی، خوارکی - داروئی
توسکانیان Betulaceae							
۱۹	<i>Corylus avellana</i> L.	فندق	فندخ	میکروفلاتروفیت	ایرانو - تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	خوارکی - داروئی
پیچ‌اتاریان Bignoniacae							
۲۰	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	پیچ اناری معمولی		مزوفلاروفیت	آروبا - سیبری	کاشته شده	زینتی
۲۱	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	کاتالپا، حوالدوزک	گچی بونیزی	مزوفلاروفیت	آروبا - سیبری	کاشته شده	زینتی - داروئی
آقطیان Caprifoliaceae							
۲۲	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	پیچ امین‌الدوله	شن	میکروفلاتروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - داروئی

۲۳	<i>Symporicarpus albus</i> (L.) S.F.Blake	مروارید سفید	-	ناآفابروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی
گوشوارکیان Celastraceae							
۲۴	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	شمشد زبانی	-	میکروفافروفت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - پرجین
سروبیان Cupressaceae							
۲۵	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	سره نقره‌ای، سرو سیمین	-	مزوفافروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی - دارویی
۲۶	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	سره شیراز، زربن	-	میگافافروفت	ایرانو-تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی - دارویی
۲۷	<i>Juniperus communis</i> L.	پیره، ارس	چته	مزوفافروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی - دارویی
۲۸	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	ارس خرنده	-	ناآفابروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی
۲۹	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	سره طبیری، نوش	-	مزوفافروفت	ایرانو-تورانی، آرپا - سیری، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - دارویی
سنجدیان Elaeagnaceae							
۳۰	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	سجد	ایده	میکروفافروفت	ایرانو-تورانی	خودرو	خوراکی، دارویی - چوب
ارمکیان Ephedraceae							
۳۱	<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk & C.A.Mey.	ارمک میانه	-	ناآفابروفت	ایرانو-تورانی، آرپا - سیری	خودرو	زینتی، دارویی - سمی
۳۲	<i>Ephedra major</i> Host	ازمک کبیر، ارمک رنگارنگ	-	ناآفابروفت	ایرانو-تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی، دارویی - سمی
باقلاییان Fabaceae							
۳۳	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	نیلک		ناآفابروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی
۳۴	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	ارغان		مزوفافروفت	آرپا - سیری، ایرانو-تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی - دارویی
۳۵	<i>Robinia hispida</i> L.	اقاقیای (بنفس(صورتی))		میکروفافروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی
۳۶	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	اقاقیا	گولالدیسیم	مزوفافروفت	آرپا - سیری، ایرانو-تورانی، صحرا - سندی	کاشته شده	زینتی - دارویی
۳۷	<i>Spartium junceum</i> L.	طاووسی		میکروفافروفت	ایرانو-تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی - دارویی
۳۸	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	اقاقیای بنفش، گلیسین		مزوفافروفت	ایرانو-تورانی، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
هیدرانتیازه Hydrangeaceae							
۳۹	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	دوتسیا		میکروفافروفت	ایرانو-تورانی، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
۴۰	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	نرگس درختی		میکروفافروفت	مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی
گردوانیان Juglandaceae							
۴۱	<i>Juglans regia</i> L.	گردو	جوزیز، گیرده‌کان	میگافافروفت	ایرانو-تورانی	کاشته شده	خوراکی - دارویی
نعناییان Lamiaceae							
۴۲	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	اسطوحودوس		ناآفابروفت	مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی - دارویی
۴۳	<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn.	رزماری		ناآفابروفت	مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی، آرایشی - دارویی
حتاییان Lythraceae							
۴۴	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	توری		میکروفافروفت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی و دارویی
۴۵	<i>Punica granatum</i> L.	انلارزینتی، انار پرپر، گلنار	هیتان	میکروفافروفت	ایرانو-تورانی، مدیترانه‌ای، صحرا - سندی	خودرو	زینتی، دارویی و خوراکی
پنیرکیان Malvaceae							
۴۶	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	ختمی چینی، ختمی زبانی		میکروفافروفت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - دارویی
۴۷	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	ختمی درختی		میکروفافروفت	ایرانو-تورانی	کاشته شده	زینتی
توپیان Moraceae							
۴۸	<i>Ficus carica</i> L.	انجیرخوراکی	انجیر	مزوفافروفت	ایرانو-تورانی	کاشته شده	خوراکی - دارویی
۴۹	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	فیکوس		میگافافروفت	آسیای جنوبی و جنوب شرقی	کاشته شده	زینتی
۵۰	<i>Macrlura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	کاکوزا، نوت آمریکایی		مزوفافروفت	آرپا - سیری	کاشته شده	زینتی

۵۱	<i>Morus alba</i> L.	توت سفید، توت هراتی	توت	مزوفانروفیت	ایرانو-تورانی	کاشته شده	دارای ارزش اقتصادی (برگ و چوب)، خوراکی- دارویی
۵۲	<i>Morus alba f. pendula</i> Dipp.	توت مجnoon		میکروفانروفیت	ایرانو-تورانی، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی- خوراکی
۵۲-۱	<i>Morus nigra</i> L.	شاه توت	شاه توت، قره توت	مزوفانروفیت	ایرانو-تورانی	خودرو	خوراکی- دارویی
گل کاغذیان Nyctaginaceae							
۵۳	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	گل کاغذی		مزوفانروفیت	آمریکای جنوبی	کاشته شده	زینتی
زیتونیان Oleaceae							
۵۴	<i>Forsythia × intermedia</i> Zabel	یاس زرد		میکروفانروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی- دارویی
۵۵	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	ون	ون، بناؤ	مگافانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی- دارویی
۵۶	<i>Fraxinus rotundifolia</i> Mill.	زان گنگشک	دلی گوش	میکروفانروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی
۵۷	<i>Jasminum fruticans</i> L.	یاسمن زرد	یاسمن	نانوفانروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی
۵۸	<i>Jasminum officinale</i> L.	یاس سفید، یاسمن سفید، یاسمن چنگالی		مزوفانروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی- دارویی
۵۹	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	برگ نو، مندارچه	قرهدون	میکروفانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی، برجن - دارویی
۶۰	<i>Olea europaea</i> L.	زینون، زینون خوراکی		مزوفانروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	خوراکی- دارویی
۶۱	<i>Syringa persica</i> L.	یاس پنخش ایرانی		میکروفانروفیت	ایرانو- تورانی	کاشته شده	زینتی
۶۱	<i>Syringa vulgaris</i> L.	یاس پنخش معمولی		میکروفانروفیت	مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی- دارویی
کاج‌جان Pinaceae							
۶۳	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) G.Manetti ex Carrière	سدر اطلسی		مگافانروفیت	آسیای جنوبی	کاشته شده	زینتی- اقتصادی (چوب)
۶۴	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don	سدر مقدس، دیودار		مگافانروفیت	ایرانو- تورانی، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی- دارویی
۶۵	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	کاج نوبل		مگافانروفیت	اروپا - سیبری	کاشته شده	زینتی- دارویی
۶۶	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	کاج نوبل کانادائی		مزوفانروفیت	اروپا - سیبری	کاشته شده	زینتی
۶۷	<i>Pinus brutia</i> var. <i>eldarica</i> (Medw.) Silba	کاج تهران، کاج الدار		مزوفانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی
۶۸	<i>Pinus halepensis</i> Mill.	کاج حلب		مزوفانروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای، آسیای جنوبی	کاشته شده	زینتی
۶۹	<i>Pinus mugo</i> Turra	کاج کوهی، کاج مشعلی		مزوفانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، آسیای جنوب شرقی	کاشته شده	زینتی
چناریان Platanaceae							
۷۰	<i>Platanus orientalis</i> L.	چنار	چنار	مگافانروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی
گندمیان Poaceae							
۷۱	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	میساناتوس		نانوفانروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
آلده‌ایان Ranunculaceae							
۷۲	<i>Clematis vitalba</i> L.	کلماتیس سفید		مزوفانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی- دارویی
عنابیان Rhamnaceae							
۷۳	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	سیاه نگرس طبی، اشنگور	خلخلال الجاره	میکروفانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی- دارویی
گل سرخیان Rosaceae							
۷۴	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	به زبانی		نانوفانروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
۷۵	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	شیرخشت		نانوفانروفیت	غرب چین	کاشته شده	زینتی
۷۶	<i>Cotoneaster integrerrimus</i> Medik.	شیرخشت برگ ساده	چالق، چالقی کبوی	نانوفانروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی
۷۷	<i>Cotoneaster nummularioides</i> Pojark.	شیرخشت سکمه‌ای		میکروفانروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی- دارویی

۷۸	<i>Crataegus azarolus</i> L.	زالالک زرد، گیالک	بیشان	میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی- خواراکی
۷۹	<i>Crataegus microphylla</i> K.Koch	سرخه و لیک، زالالک برگ ریز	گویشک، گچ، گیزرو، بیشان	میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی، خواراکی- دارویی
۸۰	<i>Crataegus pontica</i> K.Koch	زالالک گرجی	بیشان	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی- خواراکی
۸۱	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	به، شال به، به جنگلی		میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	خواراکی- دارویی
۸۲	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.	سیب	آلمما	میکروفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی	کاشته شده	خواراکی- دارویی
۸۳	<i>Malus orientalis</i> Uglitzk. ex Juz.	سیب، سیب جنگلی	آلمما، تالاسو	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	خواراکی- دارویی
۸۴	<i>Prunus armeniaca</i> L.	زردالو		مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	کاشته شده	خواراکی- دارویی
۸۵	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	گیلاس، آلوک		مزوفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	خواراکی- دارویی
۸۶	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	آلوچه قرمز		میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	خواراکی- دارویی
۸۷	<i>Prunus cerasus</i> L.	آلبالو		مزوفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی	خودرو	خواراکی، به عنوان پرچمن- دارویی
۸۸	<i>Prunus domestica</i> L.	آلورزد، آلوچه، گوجه	آل لی	مزوفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	خواراکی و دارویی
۸۹	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb	بادام تازه، بادام، شیرین	آجی بادام، بادام، چغاله	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی، خواراکی- دارویی
۹۰	<i>Prunus incana</i> (Pall.) Batsch	آلبالو کوهی، مرمه	بیرالیک	نانوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	خواراکی- دارویی
۹۱	<i>Prunus lycioides</i> (Spach) C.K.Schneid.	بادامچه، بادامچی تنگرس، بادامک	بادامچه، بادامچی	نانوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی
۹۲	<i>Prunus mahaleb</i> L.	محلب	کنره	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	خواراکی- دارویی
۹۳	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	هلو، شفتالو		میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	خواراکی
۹۴	<i>Prunus spinosa</i> L.	آلوچه، گوجه، وحشی، هلاله		میکروفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	خواراکی
۹۵	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	شیرخشت آشنین، شیرخشتی		نانوفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی
۹۶	<i>Pyracantha crenulata</i> (D.Don) M.Roem.	شیرخشتی کنکه‌ای		نانوفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی
۹۷	<i>Pyrus boissieriana</i> Buhse	گلابی گرگانی، تلکا	آرموت	میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	خواراکی- دارویی
۹۸	<i>Pyrus communis</i> L.	گلابی، خیج		مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	خواراکی- دارویی
۹۹	<i>Pyrus syriaca</i> Boiss.	گلابی سوری، امروز	گلابی، امروز، کروستیک	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	کاشته شده	خواراکی- دارویی
۱۰۰	<i>Rosa canina</i> L.	نسترن و حشی، گل سگ	گیلندیک، ایت برنی، گول بورونی	میکروفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی- دارویی
۱۰۱	<i>Rosa× damascena</i> Mill.	گل محمدی، گل گلاب	قزبل گول	نانوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی، خواراکی- دارویی
۱۰۲	<i>Spiraea crenata</i> L.	اسپیره	شلیم	نانوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی
Salicaceae بیدبان							
۱۰۳	<i>Populus alba</i> L.	سبیدار، سفیدار، کبوده	قره کواخ، گویی قلمه، پالت	مزوفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی- دارویی
۱۰۴	<i>Populus euphratica</i> Olivier	پده	قواخ، پیرآغاجی	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای، صحراء - سنندی	خودرو	زینتی
۱۰۵	<i>Populus nigra</i> L.	تبریزی، شالک	فلخه، آغ سوید	مزوفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی- دارویی
۱۰۶	<i>Salix acmophylla</i> Boiss.	زد بید	سووت، سوید، سوین	میکروفلوروفیت	ایرانو- تورانی، صحراء - سنندی	خودرو	زینتی
۱۰۷	<i>Salix aegyptiaca</i> L.	بید مشک	پیش پیشی، پیش پیشگین موس، بیدمش	مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	خودرو	زینتی- دارویی
۱۰۸	<i>Salix alba</i> L.	بید سفید، فک		مزوفلوروفیت	اروپا - سیبری، ایرانو- تورانی	کاشته شده	زینتی- دارویی
۱۰۹	<i>Salix babylonica</i> L.	بید مجnoon		مزوفلوروفیت	ایرانو- تورانی	کاشته شده	زینتی

۱۱۰	<i>Salix excelsa</i> J.F.Gmel.	سیاه بید، فوکا، بید مرتفع		مزوفاروفیت	آرپا - سیبری، ایرانو - تورانی	خودرو	زینتی - خوارکی (تهیه آب نبات)
ناترکیان Sapindaceae							
۱۱۱	<i>Acer negundo</i> L.	افرای سیاه، افرای زبان گنجشکی		مزوفاروفیت	آرپا - سیبری	کاشته شده	زینتی
۱۱۲	<i>Acer platanoides</i> L.	افرای چناری، افرای برگ چناری، کرفک		میگافاروفیت	آرپا - سیبری، ایرانو - تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی
۱۱۳	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	افرای شبه چناری		مزوفاروفیت	آرپا - سیبری، ایرانو - تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	زینتی
۱۱۴	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	باران طلایی		مزوفاروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
گل‌میمونیان Scrophulariaceae							
۱۱۵	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	دم موشی قفابی خوش‌های		میکروفاروفیت	ایرانو - تورانی، آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی
عرغیریان Simaroubaceae							
۱۱۶	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	عرعر		مزوفاروفیت	آسیای شرقی	کاشته شده	زینتی - دارویی
گزیان Tamaricaceae							
۱۱۷	<i>Tamarix dubia</i> Bunge	گز مشکوک	پورقون، پورقون آغاخی، پولنون	میکروفاروفیت	ایرانو - تورانی، صحراء - سندی	کاشته شده	زینتی
نارونیان Ulmaceae							
۱۱۸	<i>Ulmus carpinifolia</i> var. <i>umbraclifera</i> (Trautv.) Rehder	نارون چتری	قاراغاش	مزوفاروفیت	ایرانو - تورانی	خودرو	زینتی - دارویی
۱۱۹	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	ملج	قره‌آگاج	میگافاروفیت	آرپا - سیبری، ایرانو - تورانی	خودرو	زینتی
۱۲۰	<i>Ulmus minor</i> Mill.	اوچا		مزوفاروفیت	ایرانو - تورانی، مدیترانه‌ای	خودرو	زینتی - دارویی
انگوریان Vitaceae							
۱۲۱	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	مو جسب		مزوفاروفیت	آرپا - سیبری	کاشته شده	زینتی
۱۲۲	<i>Vitis vinifera</i> L.	انگور	اوروم، غوره	میگافاروفیت	ایرانو - تورانی، مدیترانه‌ای	کاشته شده	خوارکی - دارویی

دارویی با ۲ گونه (۱/۶۴ درصد) و گونه‌های زینتی - الواری با ۱ گونه، ۰/۸۲ درصد از گونه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند (جدول ۲، شکل ۷).

بحث

پژوهش حاضر نخستین مطالعه به منظور معرفی گونه‌های درختی و درختچه‌ای موجود در بخش مرکزی شهرستان زنجان است. یافته‌های حاصل حاکی از حضور ۱۲۲ گونه گیاهی درختی و درختچه‌ای متعلق به ۷۶ سرده و ۳۹ تیره در منطقه مورد مطالعه است. با توجه به این که تعداد درختان و درختچه‌های ایران، ۹۵۶ گونه در قالب ۳۲۹ سرده و ۹۹ تیره است (۷/۸ برابر تعداد گونه‌های پژوهش حاضر) (Mozaffarian, 2004)، تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای در این منطقه قابل توجه بوده و تا حدی نشان از مساعد بودن شرایط اقلیمی، آب و هوایی، اکولوژیک، رویشگاهی و ادافیک منطقه مورد مطالعه دارد.

نتایج حاصل از این پژوهش فراوانی بالای مزوفاروفیت‌ها ۳۷/۷ درصد) نسبت به دیگر اشکال زیستی را نشان می‌دهد. شکل

ایرانو - تورانی آسیای شرقی با ۵ گونه (۴/۱ درصد)، مدیترانه‌ای با ۴ گونه (۳/۳ درصد)، ایرانو - تورانی / صحراء - سندی با ۳ گونه (۲/۴۶ درصد)، آمریکای جنوبی، آسیای جنوبی، ایرانو - تورانی / اروپا - سیبری آسیای شرقی و ایرانو - تورانی / مدیترانه‌ای / صحراء - سندی هر کدام با ۲ گونه (۱/۶۴ درصد) و ایرانو - تورانی / مدیترانه‌ای / آسیای شرقی، غرب چین و ایرانو - تورانی / اروپا - سیبری / صحراء - سندی هر کدام با ۱ گونه (۰/۸۲ درصد) (جدول ۲، شکل ۶). از گونه‌های مشاهده شده در منطقه، فقط گونه *Prunus lycioides* (Spach) C.K.Schneid. اینصاری کشور ایران است. درختان و درختچه‌های منطقه بر حسب نوع استفاده به گونه‌های زینتی، زینتی - دارویی، زینتی - خوارکی، زینتی - الواری، خوارکی - دارویی، زینتی - خوارکی - دارویی، الواری - خوارکی - دارویی تقسیم می‌شوند (Mozaffarian, 2012). در مطالعه حاضر، گونه‌های زینتی با ۴۵ گونه (۳۶/۸۹ درصد)، گونه‌های زینتی - دارویی با ۴۳ گونه (۳۵/۲۴ درصد)، گونه‌های خوارکی - دارویی با ۲۰ گونه (۱۶/۳۹ درصد)، گونه‌های زینتی - خوارکی - دارویی با ۶ گونه (۴/۹۲ درصد)، گونه‌های زینتی - خوارکی با ۵ گونه (۴/۱ درصد)، گونه‌های الواری - خوارکی -

از منطقه شرایط اکولوژیک مناسبی برای استقرار گونه‌های آب‌دوسست اروپا-سیبری را فراهم نموده است. بخش‌های پایین دست و کم ارتفاع منطقه با خاک‌های مرطوب و زمستان‌های معتدل یا با سرمای کم برای رویش گونه‌های مدیترانه‌ای مناسب هستند (Payandeh et al., 2016). در این منطقه، ۴ گونه متعلق به ناحیه مدیترانه‌ای و ۳۵ گونه با سایر نواحی فیتوگرافیایی مشترک است. حضور عناصر رویشی مربوط به سایر مناطق فیتوگرافیایی از جمله عناصر صحراء-سندي شاخص بخش‌های پایین دست و کم ارتفاع با اقلیم گرم‌سیبری (۶ گونه) نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای اکولوژیک و قابلیت حمایتی خوب این منطقه برای گسترش عناصر رویشی متعلق به انواع کوروتایپ‌ها است. از آنجا که گیاهان همواره تحت تاثیر عوامل اقلیمی و ادفایکی در طول زمان تغییر یافته و دارای ویژگی اکولوژیک خاص و دامنه بردباری معینی نسبت به شرایط محیطی هستند (Nejadhabibvash et al., 2016).

از مجموع گونه‌ها، ۳۸ گونه (۳۱/۱۵ درصد گونه‌ها) خودرو هستند، با توجه به این که توسعه گیاهان فائزوفیت خودرو در اکوسیستم‌ها نیازمند فراهم بودن تمهیداتی چون خاک، دما و منابع آبی مناسب است، این موضوع بیانگر شرایط محیطی مناسب در منطقه مورد مطالعه است. شمار گونه‌های کاشته‌شده درختی و درختچه‌ای در این منطقه قابل توجه است. این گیاهان از تنوع بالایی برخوردار بوده و متعلق به تیره‌های مختلفی از نهان‌دانگان و بازدانگان هستند. این گونه‌ها به صورت بومی اغلب در کشورهای آسیای شرقی نظیر چین، ژاپن و کره، مناطق مختلف اروپا شامل اروپای مرکزی، شرقی، جنوبی، کشورهای حوزه آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا، استرالیا و مناطق حاره رویش دارند. به عنوان مثال *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach *Forsythia × intermedia* Zabel *Koelreuteria paniculata* Laxm. *Bougainvillea spectabilis* *Araucaria araucana* (Molina) Willd. *Juniperus horizontalis* K.Koch *Maclura pomifera* (Raf.) C.K.Schneid. Moench *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. و *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. بومی ژاپن، گونه *Spach* بومی چین و ژاپن، گونه *Koelreuteria paniculata* Laxm. *Bougainvillea spectabilis* بومی چین، کره و ژاپن، گونه *Araucaria araucana* (Molina) Willd. *Juniperus horizontalis* K.Koch بومی شیلی و گونه‌های *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. و *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. اشاره کرد. از گونه‌های درختی غیرمتمر، بزرگ و سایه‌دار در کنار سیبری‌های رفت و آمد، حاشیه باغ‌ها و خیابان‌ها به منظور ایجاد سایه و جلوگیری از نفوذ هوای گرم و گردوخاک، از گیاهان گل‌دار درختچه‌ای و بوته‌ای برای مقاصد طراحی منظر و فضای سبز و از

زیستی گیاهان بر اساس سازگاری ریخت‌شناختی آن‌ها با شرایط محیطی تعیین می‌گردد (Basiri et al., 2011); حضور بالای این شکل زیستی حاکی از شرایط مناسب رویشی و منابع آبی و رطوبت مناسب جهت توسعه این فرم است. کمترین میزان از فراوانی شکل زیستی مربوط به فرم مگافانروفیت است. توسعه این شکل از اشکال زیستی نیازمند وجود شرایط مرطوب‌تر است که در این منطقه موجود نیست.

از مجموع ۱۲۲ گونه درختی و درختچه‌ای، ۱۵ گونه (۱۲/۳) درصد) به بازدانگان تعلق دارند که کاشته شده هستند. با توجه به این‌که تعداد گونه‌های بازدانگان ایران ۱۷ گونه است (Ghahremaninejad et al., 2017) تعداد بازدانگان کاشته شده در بخش مرکزی شهرستان زنجان قابل توجه است. در میان تیره‌های نهان‌دانگان، دولپه‌ای‌ها از تنوع بالایی برخوردار بودند (۱۰۵ گونه). تیره گل سرخ با دارا بودن ۲۹ گونه متنوع‌ترین تیره بود. در میان گیاهان تیره گل سرخ، سرده *Prunus* با ۱۱ گونه بیش‌ترین فراوانی را دارد. تنوع بالای گیاهان متعلق به این تیره در مطالعات مربوط به سایر مناطق نیز مشاهده شده است (Mozaffarian, 2004; Ravanbakhsh & Etemad, 2008; Azzar et al., 2012; Tabad et al., 2016; Pahlavani et al., 2017) درختان و درختچه‌های تیره گل سرخ از سازگاری‌های ریخت‌شناختی بالایی در مقابل رویشگاه برخوردارند. تنوع اندازه گیاه، تنوع سایر موه، تنوع فرم ریختی، دگرلقارحی، تبادل ژنی وسیع و هیبریداسیون فراوان از مهم‌ترین دلایل این شمار بالا است. پس از تیره گل سرخ، تیره زیتون دومین تیره فراوان منطقه است. گیاهان این تیره از نظر مصارف غذایی (زیتون)، زینتی (یاس و یاس بنفش) و فضای سبز (زبان گنجشک) حائز اهمیت هستند. نتایج حاصل از بررسی کوروتایپ گیاهان درختی و درختچه‌ای موجود در منطقه حاکی از وفور عناصر رویشی ایرانو-تورانی ۲۶ گونه مشخصا ایرانو-تورانی و ۵۹ گونه مشترک با سایر نواحی فلوریستیک) و اروپا-سیبری (۱۷ گونه مشخصا اروپا-سیبری و ۳۰ گونه مشترک با سایر نواحی فلوریستیک) است که بته با توجه به موقعیت استان زنجان و استقرار این ناحیه از شمال غرب کشور در فیتوکوپرون ایرانو-تورانی و همچنین مجاورت این استان با استان‌های گیلان و اردبیل، این فراوانی بالا دور از انتظار نیست. در مطالعات محققین دیگر در مناطق شمال غرب و غرب کشور نیز وفور گیاهان ایرانو-تورانی دیده می‌شود (Mozaffarian, 2004; Yusefi, 2006; Tabad et al., 2016) تابستان‌های گرم در بخش‌های کوهستانی منطقه شرایط رویش گونه‌های ایرانو-تورانی را فراهم کرده است. ذوب برف‌های زمستانی، ایجاد نهرها و رودخانه‌ها و رطوبت کافی در بخش‌هایی

REFERENCES

- APG IV.** 2016. An update of the Angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linn. Soc. 181: 1-20.
- Assadi, M. et al. (eds.).** 1988-2018. Flora of Iran. Vols.1-149. RIFR, Tehran.
- Azzar, A., Siami, A., Khara, J. & Valizadegan, O.** 2012. Study of diversity of trees and shrubs of Naghadeh County (Soldooz) in West Azerbaijan province. 2th National Congress of Biodiversity and its effect on Agriculture and Environment, Urmia, Iran.
- Basiri, R., Taleshi, H., Poorrezaee, Hassani, S.M. & Ghareghhani, R.** 2011. Flora, life form and chorotypes of plants in river forest Behbahan, Iran. M. E. J. Sci. Res. 2: 246-252.
- Davis, P.H. (ed.).** 1965-1988. Flora of Turkey and the east Aegean islands. Vols. 1-10. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
- Esmailzadeh, O., Hosseini, S. M., Asadi, H., Ghadiripour, P. & Ahmadi, A.** 2012. Plant biodiversity in relation to physiographical factors in Afratakhete Yew (*Taxus baccata* L.) Habitat, NE Iran. J. Plant. Biol. 12: 1-12.
- Ghahremaninejad, F., Ataei, N. & Nejad Falatoury, A.** 2017. Comparison of angiosperm flora of Afghanistan and Iran in accordance with APG IV system. Nova Biol. Reperta 4: 73-97.
- Ghanbari, S. & Sheidai Karkaj, E.** 2018. Diversity of tree and shrub species in woodlands of Guijeh-bel region of Ahar. Iranian J. Forest Poplar Res. 1: 118-128.
- Golchin, A.** 2007. Effect of heavy metals on rangelands and livestock in Zanjan Province. Agricultural Jihad organization, agricultural and natural resources research center of Zanjan Province, management and planning organization of Zanjan Province, 89 pp.
- Hosseini, A.** 2014. Diversity of tree and shrub species in relation to topographic factors and stand characteristics in Persian oak forests of Ilam province. (Case study; Miantang forests in Sirvan). J. Pl. Res. 2: 194-203.
- Hosseini, A.** 2016. Gradient effect of altitude on the diversity of tree species in oak forests of Hayanan, Ilam. J. Nat. Ecosys. Iran. 1: 1-8.
- Hui, G. & Pommerening, A.** 2014. Analyzing tree species and size diversity patterns in multi-species uneven-aged forests of Northern China. Forest Ecol. Managem. 316: 125-138.
- IPNI.** 2016. The International Plant Names Index. Retrieved from <http://www.ipni.org>. On: 3 December 2016.
- Javanshir, K.** 1976. Atlas of woody plants of Iran. – National Society of Natural Resources and Human Environment Conservation, Tehran, 163pp.
- Komarov, V.L. (ed.).** 1933-1964. Flora of U.S.S.R. Vols. 1-30. Akademiya Nauk SSSR, Moscow and Leningrad.
- Krebs, C.J.** 2001. Ecology: The experimental analysis of distribution and abundance. Benjamin Cummings, Sanfransisco, 608 pp.
- Larti, M., Gasempour, S. & Maassoumi, A.A.** 2011. Trees and shrubs in Marmisho area in West Azarbaijan. Iran. J. Biol. 1: 104-109.

درختان میوه‌دار به منظور استفاده از میوه آن‌ها برای مصارف خوراکی بهره‌برداری شده است (Momen Roomiany, 2001). در منطقه مورد مطالعه در این تحقیق نیز گونه‌های گیاهی درختی و درختچه‌ای متنوعی به منظور مصارف گوناگون شامل کاربردهای زینتی و فضای سبز، دارویی، خوراکی و تهییه الوار کاشته شده است که به نوعی مشابه استفاده‌ای است که در سایر مناطق کشور نیز صورت گرفته است. در این مطالعه گونه‌های درختی و درختچه‌ای که استفاده دارویی دارند بیشترین سهم (۵۸/۱۹ درصد) را به خود اختصاص می‌دهند که نشان‌دهنده سازگاری آن‌ها با منطقه Rasam & Mashayekhan, (2015; Nejadhabibvash et al., 2016 گونه‌های زینتی و خوراکی قرار دارند.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله از کارکنان اداره کل هواشناسی استان زنجان به‌ویژه خانم سکینه امامی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در ارائه اطلاعات آب و هوایی و نقشه جغرافیایی منطقه مذبور جهت انجام این پژوهش قادردانی می‌کنند.

- Momen Roomiany, E.** 2000. Introduction of one Hundred species of trees and shrubs suitable for landscape design. Research Institute of Forests and Rangelands Publications, Tehran, 118 pp.
- Mousavi, A.** 2000. Final report of research project of collection and identification of plants of Zanjan province and establishment of herbarium in research center of natural resources and livestock affairs of Zanjan province. Research Center of Natural Resources and Livestock Affairs of Zanjan province, 205 pp.
- Mozaffarian, V.** 1998. A dictionary of Iranian plant names. Farhang-e Moaser Publication, Tehran, 740 pp.
- Mozaffarian, V.** 2000. Plant classification. Vols. 1-2. Amir Kabir Publications, Tehran, 1111 pp.
- Mozaffarian, V.** 2004. Trees and shrubs of Iran. Farhang-e Moaser Publications, Tehran, 1003 pp.
- Mozaffarian, V.** 2012. Study of medicinal and aromatic plants of Iran. Farhang-e Moaser Publications, Tehran, 1444 pp.
- Nejadhabibvash, F., Makali, H. & Rezaei Chiyaneh, E.** 2016. Flora, life form and chorology of plants in Razhan protected area in West Azerbaijan Province. *Taxon. Biosyst.* 27: 85-95.
- Pahlavani, A. H., Aminirad, M. & Sajedi, S.** 2017. Trees and shrubs of plant Protection Research Institute. – Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 179 pp.
- Payandeh, M., Bordbar, F. & Mirtadzadini, S.M.** 2016. Floristic strudy of Hanza-kuh of Bahr-Aseman protected area (SE Iran). *Taxon. Biosyst.* 28: 79-100.
- Proen  a, V., Martin, L.J., Pereira, H.M., Fernandez, M., McRae, L., Belnap, J., B  ohm, M., Brummitt, N., Garc  a-Moreno, J., Gregory, R.D., Honrado, J.P.,**
- J  rgens, N., Opige, M., Schmeller, D.S., Tiago, P. & Van Swaay, C.A.M.** 2017. Global biodiversity monitoring: from data sources to essential biodiversity variables. *Biol. Conserv.* 213: 256-263.
- Rasam, Gh.A. & Mashayekhan, A.** 2015. Studying of floristic, life form and chorology of medicinal plants in Shirvan natural cosystems. *J. Pl. Ecosys. Conserv.* 6: 27-42.
- Raunkiaer, C.** 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford, 632 pp.
- Ravanbakhsh, H. & Etemad, V.** 2008. Recognition and introduction of natural forests stands of Tehran province. *JES* 46: 19-32.
- Rechinger, K.H. (ed.).** 1963-2015. *Flora Iranica*. 1-174: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz; 175: Akademische Verlagsgesellschaft, Salzburg; 176-181: Naturhistorisches Museum, Wien.
- Tabad, M.A., Jalilian, N. & Maroofi, H.** 2016. Study of flora, life form and chorology of plant species in Zarivar region of Marivan, Kurdistan. *Taxon. Biosyst.* 29: 69-102.
- Takhtajan, A.L.** 1986. *Floristic regions of the world*. University of California Press, Berkeley, 544 pp.
- The Plant list (version1.1).** Retrieved from <http://www.theplantlist.org>. On: 3 September 2013.
- Yusefi, M.** 2006. Flora of Iran. Payam-e Noor University Publications, 227 pp.
- Zohary, M.** 1973. Geobotanical foundations of the Middle East. *Geobotanica Selecta*, vols.1-2. Gustav Fisher Verlag, Stuttgart, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 739 pp.

How to cite this article:

Toghranegar, Z. & Vafadar, M. 2020. Introduction of tree and shrub plant species in the central district of Zanjan County. *Nova Biologica Reperta* 7: 119-132. (In Persian).

طغرانگار ز. و وفادار، م. ۱۳۹۹. معرفی گونه‌های گیاهی درختی و درختچه‌ای بخش مرکزی شهرستان زنجان. *یافته‌های نوین در علوم زیستی* ۷: ۱۱۹-۱۳۲.