

اثر ضد افسردگی عصاره هیدروالکلی چویل در مدل ایسکمی/هاپوپر فیوژن در موش صحرا ای نر ویستار بالغ

زینب عیدی پور^۱، مریم رفیعی راد^{۲*}، شهربانو عالمی رستمی^۳ و زهرا زنگنه نژاد^۲

دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۰ ویرایش: ۱۳۹۷/۶/۲۹ پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۲۴ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۹

^۱ گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

^۲ گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

^۳ گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان، مرکز گرگان، گرگان، ایران

* مسئول مکاتبات: Rafieirad.m@Izehiau.ac.ir

چکیده. در بیماران مبتلا به ایسکمی مغزی، چه در زمان بستره و چه در جامعه، شیوع افسردگی مازور مشهود است از آنجا که افسردگی بر روی بهبود فرد تأثیر منفی دارد، تشخیص و درمان بهموقع آن ضروری است. این مطالعه به تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی چویل بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو مغز و افسردگی پس از انسداد دو طرفه دائم شریان کاروتید مشترک یا همان ایسکمی/هاپوپر فیوژن در موش صحرایی های نر بالغ می‌پردازد. تعداد ۳۵ موش صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های کنترل، ایسکمی و گروه‌های ایسکمی دریافت کننده ۱۴ روزه دوزهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg عصاره چویل به روش گاواظ تقسیم شدند. برای ایجاد مدل حیوانی از ایسکمی/هاپوپر فیوژن مغزی دائم، شریان های کاروتید به فاصله یک هفته از بالا و پایین بسته شده و برش یافتند. برای سنجش افسردگی زمان بی‌حرکتی در شناور اجرای اندازه گیری شد و سپس بافت مغز برای تفکیک هپیو کامپ و اندازه گیری مالون دی‌الدئید خارج گردید. در گروه ایسکمی/هاپوپر فیوژن، زمان بی‌حرکتی و مالون دی‌الدئید افزایش معنی داری نشان داد و گاواظ هر سه دوز عصاره چویل به مוש های ایسکمی باعث کاهش قابل توجه غلظت مالون دی‌الدئید در هپیو کامپ و نیز کاهش زمان بی‌حرکتی به ترتیب در دوز ۱۰۰ و دوزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg گردید و افزایش زمان شنا در هرسه گروه دریافت کننده عصاره مشاهده گردید. عصاره چویل با اثر آنتی اکسیدانی می‌تواند از عوارض ناشی از ایسکمی از جمله افسردگی را بکاهد.

واژه‌های کلیدی. استرس اکسیداتیو، انسداد شریان کاروتید، شناور اجرایی، عصاره گیاهی، مالون دی‌الدئید

Anti-depressive effects of hydro-alcoholic extract of Chevilan (*Ferulago angulate* Boiss.) in adult male wistar rat model of ischemia/hypoperfusion

Zainab Eidipour¹, Maryam Rafieirad^{2*}, Shahrbanoo Alami Rostami³ & Zahra Zangenehzad²

Received 11.09.2017/ Revised 10.04.2018/ Accepted 24.04.2018/ Published 20.09.2018

¹ Department of Biology, Faculty of Sciences, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

² Department of Biology, Faculty of Sciences, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran

³ Department of Biology, Islamic Azad University, Gomishan Branch, Gorgan Center, Gorgan Iran

*Correspondent author: Rafieirad.m@Izehiau.ac.ir

Abstract. In patients with cerebral ischemia, both during hospitalization and in the community, the prevalence of major depression is evident. Since the depression has a negative impact on recovery, its timely diagnosis and treatment is essential. This study aimed to evaluate the effect of the oral administration of Chevilan extract (*Ferulago angulata* hydroalcoholic extract; 100, 200 and 400 mg/kg) on brain oxidative stress indices and depression after permanent bilateral common carotid artery occlusion or ischemia/hypoperfusion in male adult rats. A number of 35 rats were divided into a control group, an ischemic group and ischemic groups receiving doses of 100, 200 and 400 mg/kg of Chevilan extracts for 14 days by gavage. To make animal models of permanent cerebral hypoperfusion/ischemia, right common carotid artery was ligatured first and the left one ligatured with an interval of one week. To evaluate depression, immobility in the forced swimming time of each rat was measured and then the rat's brain tissues were extracted to separate hippocampus and measure malondialdehyde. The results showed that ischemia/hypoperfusion increased brain oxidants such as lipid per oxidation (LPO) and immobility. Also, ischemic rats treated with all three doses of the Chevilan show significant reduction in the concentration of MDA hippocampus and in immobility time at a dose of 100 mg/kg and 200 / 400mg, respectively. Increased swimming time was observed in all three groups of extract recipients. It was found that Chevilan extract with antioxidant effect can reduce the side effects of ischemia such as depression.

Keywords. carotid artery occlusion, forced swimming, herbal extract, malondialdehyde, oxidative stress

مقدمه

بیماری‌های عصبی موثر است و همچنین اثرات ضدمیکروبی و ضدانگلی دارد (Hosseini et al., 2012) و در کاهش استرس اکسیداتیو در بیماری پارکینسون موثر بوده است (Sharifi et al., 2015). براساس ترکیبات آنتیاکسیدانی چویل، هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی چویل بر فاکتورهای حاصل از استرس اکسیداتیو مانند پراکسیداسیون لیپیدی در بافت هیپوکامپ و افسردگی در مدل حیوانی ایسکمی هیپوپرفوژن قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از ۳۵ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار تهیه شده از مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با محدوده وزنی ۲۵۰-۲۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات در شرایط استاندارد $20^{\circ}\pm 2$ درجه‌ی سانتی‌گراد و سیکل روشنایی- تاریکی ۱۲ ساعته (روشنایی از ۷ صبح آغاز می‌شود) و دسترسی کافی به غذای شرکت چاودانه شهرضاي اصفهان و آب تصفیه شهری و در مرکز نگهداری دانشگاه در درون قفس‌های استاندارد نگهداری شدند. برای آسان شدن کار و سازش با شرایط محیط و آزمایش‌کننده، حیوانات از قبل روزانه به مدت چند دقیقه دست‌آموز می‌شدند. حیوانات به طور تصادفی به گروه‌های زیر تقسیم شدند: گروه کنترل؛ گروه ایسکمی با استرس هر دو شریان کاروتید مشترک و سه گروه ایسکمی که عصاره‌ی چویل با دوزهای (۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg) را به روش گلاواز به مدت ۱۴ روز دریافت کردند (Mirzapour et al., 2015). پرتوکل این تحقیق براساس قوانین بین‌المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیته اخلاق دانشگاه به تصویب رسید.

روش جراحی ایجاد ایسکمی

پس از یک روز محرومیت غذایی به حیوانات، بیهوشی با کتابیین/ زیلازین (۱۰۰ میلی‌گرم/ ۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) القاء گردید. شکافی در وسط بخش شکمی پوست گردن ایجاد شد و بافت چربی زیر پوستی برداشته شده و از تیروپید دور می‌شود. و شریان کاروتید پس از مشاهده و آشکار شدن از بافت‌های اطراف جدا شده و به وسیله ابزارهای بخیه‌ی پوستی با دو گره محکم در حول رگ (بالا و پایین) مسدود و سپس شریان‌ها به طور کامل قطع شدند. حیوانات پس از به هوش آمدن اجازه داشتند تا آب و غذا مصرف کنند. بعد از یک هفته

در ایسکمی گلوبال خون و اکسیژن کافی به تمامی یا بخش‌هایی از مغز نمی‌رسد؛ بنابراین، عمل کرد نرمال نورون‌ها مختل می‌گردد (Lipton, 1999). انسداد شریان کاروتید مشترک چپ و راست به مدت چند دقیقه باعث به وجود آمدن ایسکمی هیپوپرفوژن می‌شود (Farkas et al., 2007) که فشار خون را در موش صحرایی به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد (Farkas et al., 2007). در ایسکمی رادیکال‌های آزاد اکسیژن واکنش‌دهنده از قبیل پراکسیدهیدروژن و رادیکال هیدروکسیل تولید می‌شوند (Niatsetskaya et al., 2012). تولید پراکسیدها و رادیکال‌های آزاد و در نتیجه استرس اکسیداتیو در نهایت آسیب به تمامی مولفه‌های سلولی از جمله پروتئین‌ها، لیپیدها و DNA به دنبال دارد (Liu et al., 2014). پراکسیداسیون لیپیدی به آسیب اکسیداتیو لیپیدها اشاره دارد که حذف الکترون‌ها از لیپیدهای غشاء سلولی توسط رادیکال‌های آزاد ایجاد شده و نقایص سلولی را در پی خواهد داشت. گونه‌های اکسیژن واکنشی، لیپیدهای اشباع نشده را کاهش داده و مالون‌دی‌الدینید را تولید می‌کنند (Prie et al., 2016). استرس اکسیداتیو در بسیاری از بیماری‌ها از جمله افسردگی نقش دارد (Liu et al., 2015). افسردگی جزو شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به ایسکمی مغزی محسوب می‌گردد و فراوانی آن از ۶۵٪ تا ۲۰٪ موارد گزارش شده است (Bhogal et al., 2004). از تنش‌های دیگر ایسکمی، به غیر از افسردگی مهار انتقال الکترون میتوکنندربایی و آسیب اکسیداتیو را می‌توان نام برد (Ferulago Wiegand et al., 1999). چویل با نام علمی *angulate Boiss.* یکی از گیاهان بومی ایران است و به عنوان گیاه دارویی کاربرد دارد (Ghasempour et al., 2007; Goudarzi & Rafeirad, 2017). در تجزیه‌ی انسانس بذر و بخش‌های گیاهی این گونه ۵۷٪ جزء شناسایی شده است که فراوان‌ترین جزء در بخش‌های هوایی سیس-اسیمن و در دانه آلفا-پین می‌باشد (Ghasempour et al., 2007). عصاره‌ی چویل غنی از ترکیبات فلی است و یکی از گیاهان مهم در ایران است (Mojtaba et al., 2010; Hosseini et al., 2012). ترکیبات فلی، به علت دارا بودن خواص آنتی‌اکسیدانی، قادر به مهار رادیکال‌های آزاد هستند؛ بنابراین، آن‌ها می‌توانند در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها مانند سرطان، قلبی و عروقی و

شرايط ، حيوانات برای حفظ پايداري خود در آب شنا می کردن. پس از مدتی، حيوانات با قطع حرکات دست و پای خود از تحرک و فعالیت باز می مانند که به طور قراردادی به آن زمان بی حرکت شدن (immobility time) می گويند. برای اندازه گیری زمان بی حرکتی، مدت زمان بی حرکتی حيوان در طی محدوده زمانی مشخص توسيع کرونومنتر ثبت گردید. زمان گیری تمام نمونه ها برای تمام گروهها يكسان و زمان آزمایش شنای اجباری ۶ دقیقه توسيع يك فرد اندازه گیری و تجزيه و تحليل شد. شرايط محیط برای تمام گروهها يكسان و زمان آزمایش شنای اجباری ۶ دقیقه بود. در اين حالت افزایش زمان بی حرکتی را معادل افسردگی و کاهش آن را به عنوان اثر بخشی درمان ضد افسردگی ارزیابی شد (Eyup et al., 2016a).

تجزیه و تحلیل داده ها

داده های اين تحقیق به صورت Mean \pm SEM ارائه و سپس با روش های مناسب آماری در محیط نرم افزارهای Excel و SPSS و با استفاده از روش های ANOVA و تست پشتیبان LSD آنالیز گردید و تفاوت نتایج بين گروه های مختلف با حداقل $p < 0.05$ معنی دار تلقی شد.

نتایج

در اين مطالعه غلظت مالون دی الديد (MDA) افزایش قابل توجهی را در هيپوكامپ حيوانات گروه ايسکمی در مقایسه با کنترل نشان داد. براساس مشاهدات، غلظت مالون دی الديد در بافت هيپوكامپ موش های ايسکمی که سه دوز عصاره چویل را به مدت ۱۴ روز روزی يك بار به روش گاواژ دریافت کردن، هر سه دوز ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه ايسکمی نشان دادند (شکل ۱). در بخش بررسی افسردگی توسيع تست شنای اجباری، زمان بی حرکتی در موش های ايسکمی شده افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل سالم نشان دادند. در تجویز ۱۴ روزه ی دوز ۱۰۰ mg/kg عصاره چویل و دوز های ۲۰۰ و ۴۰۰ به موش های ايسکمی شده کاهش معنی دار زمان بی حرکتی نسبت به گروه ايسکمی مشاهده گردید (شکل ۲). مدت زمان شنا در موش های ايسکمی شده کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل سالم نشان دادند. در تجویز ۱۴ روزه ی دوز ۱۰۰ mg/kg عصاره چویل و همچنین دوز های ۲۰۰ و ۴۰۰ به موش های ايسکمی شده افزایش معنی دار زمان شنا نسبت به گروه ايسکمی مشاهده گردید (شکل ۳).

جراحی مشابه در طرف دیگر انجام گردید (Mirzapour et al., 2015).

روش تهیه عصاره هيپوكامپ


چویل از رشته کوه های زاگرس در استان خوزستان جمع آوری شد. سرشاخه های گیاه در محیط خشک و تاریک به مدت دو هفته جهت خشک شدن نگهداری شد. بعد از پودر کردن گیاه و آسیاب نمودن، ۲۵۰ گرم از آن را وزن نموده و به وسیله ی ۱۰۰۰ میلی لیتر الکل اتانول ۷۲ درصد به حجم رسانده شد. پس از سه روز نگهداری در محیط آزمایشگاه و همزدن (جهت جداسازی تمامی مواد تشکیل دهنده گیاه در آب و الکل) و درنهایت صاف کردن، در سینی جهت خشک شدن پهنه شد. درجهی خلوص این عصاره ۱۴ درصد محاسبه گردید (Goudarzi & Rafeirad, 2017).

سنجهش مالون دی الديد

پس از استخراج مغز بافت هيپوكامپ وزن شده و با ازاء هر ۱ گرم بافت ۱۰ میلی لیتر محلول ۱/۵٪ کلرید پتاسيوم اضافه شد و هموژن گردید. از محلول هموژن شده ۰/۵ میلی لیتر برداشته شده و ۲/۵ میلی لیتر تری كلورو استیک اسید ۳٪ به آن اضافه شد و مدت ۱۰ دقیقه در بن ماري ۳۷ درجه نگهداری شد. سپس ۱۰ دقیقه در دور ۳۰۰۰ سانتريفيوژ شد. ۰/۵ میلی لیتر از محلول رویی بعد از سانتريفيوژ برداشته شد و به هر يك ۳ میلی لیتر محلول ۱٪ اسید فسفریک و ۱ میلی لیتر محلول ۶/۷٪ تری باریتوريک اسید اضافه شده و ۴۵ دقیقه در آب جوش قرار گرفتند. لوله ها در ظرف يخ خنک شدند و به هر يك ۴ میلی لیتر بوتانول اضافه شد. بعد از ورتكس کردن، در ۳۵۰۰ دور به طور لحظه ای سانتريفيوژ شده و در نهايیت جذب در طول موج ۵۳۲nm خوانده شد و پس از قرار دادن اعداد حاصل از اسپکترو فوتومتری و جذب در معادله خطی منحنی استاندارد میزان غلظت MDA بر اساس (nmol/g wet tissue). (Rafieirad et al., 2011).


تست شنای اجباری (Forced Swimming Test) FST

این تست، تستی برای ارزیابی افسردگی است. روش آزمایش به این صورت بود که سیلندری بی رنگ به اندازه 60×30 سانتی متر (ارتفاع \times قطر داخلی) که با آب ۲۳ درجه با ارتفاع ۴۰ سانتی متر پر شده است مهیا می کنیم. موش ها را به صورت انفرادی از ارتفاع ۲۰ سانتی متر و به ملايمت در اين سیلندر سرباز می اندازیم. در اين




شکل ۱- مقایسه میانگین ± انحراف معیار غلظت مالون دی آلدید بین گروه کنترل، گروه ایسکمی و گروه ایسکمی دریافت کننده ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ mg/kg عصاره چویل به مدت ۱۴ روز.

Fig. 1. Comparison of mean ± standard deviation of malondialdehyde concentration between control group, ischemic group and ischemic group receiving 100, 200, 400 mg/kg of Chevilan extract for 14 days.



شکل ۲- مقایسه میانگین ± انحراف معیار زمان بی حرکتی بین گروه کنترل، گروه ایسکمی و گروه ایسکمی دریافت کننده ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ mg/kg عصاره چویل به مدت ۱۴ روز.

Fig. 2. Comparison of mean ± standard deviation of immobilization time between control group, ischemic group and ischemic group receiving 100, 200, 400 mg / kg of Chevilan extract for 14 days.



شکل ۳- مقایسه میانگین ± انحراف معیار زمان شنا بین گروه کنترل، گروه ایسکمی و گروه ایسکمی دریافت کننده ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ mg/kg عصاره چویل به مدت ۱۴ روز.

Fig. 3. Comparison of mean±standard deviation of swimming time between control group, ischemic group and ischemic group receiving 100, 200, 400 mg / kg of Chevilan extract for 14 days.

بحث

al., 2013). عصاره‌ی چویل فعالیت ضدمیکروبی قوی‌تری نسبت به اسانس آن دارد (Özkan et al., 2008). نتایج Khanahmadi و Janfeshan (2010) نشان دادند عصاره‌ی مтанول برگ‌های نر و ماده و میوه‌های چویل دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی هستند. گیاه چویل غنی از ویتامین‌ها، مواد معدنی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا، فلن و فلاونوئید‌هاست (Kiziltas et al., 2017). همچنین در مطالعات پیشین دخالت انتقال‌دهنده‌ی عصبی گابا در میانجی‌گری (Khosravi et al., 2017; Skorzewska et al., 2015) کاهش در سیگنالینگ گیرنده‌ی گابا A باعث اختلالات عصبی مانند بی‌خوابی، اضطراب و صرع می‌گردد (Subash et al., 2015). در رأس اختلالات روانپژشکی متعاقب سکته، افسردگی قرار دارد که خود به طور مستقل با عوارض عدیده همراه می‌باشد (Iranmanesh, 2012). در مطالعات Bagci Eyup و همکاران (2016) اثرات ضد اضطرابی و ضد افسردگی اسانس چویل در شناخت اجباری در بیماری آلزایمر گزارش داده شد در این مطالعه نشان داده شد که مواد موثره چویل از جمله α -پین، β -پین، α -فلاندرن و β -فلاندرن توان اتصال به گیرنده‌های گابا همچون داروهای ضد افسردگی مانند دیازپام را دارند. Rafeirad و Goudarzi (2017) و Sharifi و همکاران (2015) نشان دادند که α -پین چویل پراکسیداسیون لیپیدی در مدل حیوانی پارکینسون را کاهش می‌دهند.

نتیجه‌گیری

در تأیید مطالعات پیشین مطالعه‌ی ما نیز فعالیت آنتی‌اکسیدانی چویل را از طریق کاهش لیپید پراکسیداسیون به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو نشان داد و همچنین باعث کاهش معنی‌دار بی‌حرکتی در شناخت اجباری و در نتیجه افسردگی ناشی از ایسکمی گردید و با توجه به نتایج حاصل بررسی اثر مواد موثره گیاه چویل بر میزان دیگر شاخص‌ها و آنزیم‌های دخیل در واکنش‌های استرس اکسیداتیو در مدل‌های حیوانی ایسکمی پیشنهاد می‌شود تا بتوان جایگزین مناسبی جهت دارو درمانی بیماری‌های ایسکمیک معرفی نمود.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه به دلیل همراهی در انجام این تحقیق تشکر می‌نمایند.

در بخش اول این مطالعه ایسکمی افزایش قابل توجهی در غلظت مالون دی‌الدید (MDA) در هیپوکامپ نشان داد و تجویز هر سه دوز عصاره چویل غلظت MDA را کاهش دادند و در بخش بررسی اثر ضد افسردگی، مدت زمان بی‌حرکتی در موش‌های ایسکمی افزایش نشان داد و تجویز سه دوز عصاره چویل (۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ mg/kg) منجر به کاهش افسردگی گردید. ترکیبات فلی به عنوان دهنده الکترون عمل نموده و ممکن است واکنش‌های ناخواسته ناشی از رادیکال‌های آزاد در بدن را خنثی کنند (Rajesh Maniana et al., 2008). همچنین دارای فعالیت بیولوژیک متنوع از جمله آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدالتهابی می‌باشد (Jamshidi, 2010) و به همین دلیل در توقف روند تخریب سیستم عصبی و پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله ایسکمی از طریق مهار رادیکال‌های آزاد و محافظت از سلول‌ها در برابر واکنش‌های اکسیداتیو موثر می‌باشد (Yang et al., 2016). خود سکته یا ایسکمی مغزی یک مسیر سیگنالی که حاصل آن تولید رادیکال‌های آزاد است را به راه می‌اندازد و استرس اکسیداتیو ناشی از آن به شدت و تداوم بیماری بستگی دارد و به اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین‌ها در سیستم اعصاب مرکزی می‌انجامد که با آسیب سلولی همراه است (Chen et al., 2011). ارزیابی استرس اکسیداتیو با استفاده از شاخص‌های مختلف انجام می‌شود که یکی از آنها شامل محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپید (MDA) است. MDA با تیوباریتوريک اسید (TBA) یک مشتق فلورسنت قرمز را ایجاد می‌کند که با کمک اسپکتروفوتومتر قابل ارزیابی است (Sharifi et al., 2015). امروزه، گیاهان دارویی یا مکمل‌های غذایی توجه عموم را به خود جلب کرده‌اند. Farzin و همکاران (2005 & 2013) اثر ضد افسردگی عصاره‌ی مтанولی زنجیبل در موش‌های دیابتی و oil Rose و oil Geranium را با استفاده از تست شناخت اجباری نشان دادند. همچنین عصاره‌های آبی و هیدرووالکلی اسطوخودوس در آزمون شناخت اجباری اثر ضد افسردگی نشان داده‌اند (Abbasi Maleki et al., 2013). اسانس بخش‌های هوایی چویل شامل انواع مولفه‌ها با اثرات درمانی مختلف است (Mojtaba et al., 2010). چویل با توجه به زمان و دوز مانع تکثیر سلول‌های لنفوم و لوسمی احتمالاً از طریق مسیرهای وابسته به آپوپتوز می‌شود (Farzin et al., 2010).

REFERENCES

- Abbasi Maleki, S., Bekhradi, R., Asgharpanah, J., Abbasi Maleki, F. and Maleki Ahanghari, N.** 2013. Antidepressant-like effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of *Lavandula angustifolia* Mill in forced swim test and tail suspension test in male mice. – Arak Med. Univ. J. 16: 65-75.
- Bhogal, S.K., Teasell, R., Foley, N. and Speechley, M.** 2004. Lesion location and poststroke depression: systematic review of the methodological limitations in the literature. – Stroke 35: 794-802.
- Chen, H., Yoshioka, H., Kim, G.S., Jung, J.E., Okami, N., Sakata, H., Maier, C.M., Narasimhan, P., Goeders, C.E. and Chan, P.H.** 2011. Oxidative stress in ischemic brain damage: mechanisms of cell death and potential molecular targets for neuroprotection. – Antioxid. Redox Signal 14: 1505-1517.
- Bagci, E., Aydin, E., Mihasan, M., Maniu, C. and Hritcu, L.** 2016. Anxiolytic and antidepressant-like effects of *Ferulago angulata* essential oil in the scopolamine rat model of Alzheimer's disease. – Flavour Frag. J. 31: 70-80.
- Farkas, E., Luiten, P.G. and Bari, F.** 2007. Permanent, bilateral common carotid artery occlusion in the rat: a model for chronic cerebral hypoperfusion-related neurodegenerative diseases. – Brain Res. Rev. 54: 162-180.
- Farzin, D., Fathiazad, F. and Fazellian, M.** 2013. Antidepressant effect of methanolic ginger extract in diabetic mice using forced-swim test. – J. Mazandaran Univ. Med. Sci. 23: 208-220.
- Farzin, D., Zarghami, M. and Khalaj, L.** 2005. Evaluation of antidepressant activities of Rose oil and Geranium oil in the mouse forced swim test. – J. Babol Univ. Medical Sci. 7: 7-13.
- Ghasempour, H.R., Shirinpour, E. and Heidari, H.** 2007. The constituents of essential oils of *Ferulago angulata* (Schlecht.) Boiss at two different habitats, Nevakoh and Shahoo, Zagross mountain, western Iran. – Iran J. Sci. Technol. Trans. A Sci. 31: 309-312.
- Goudarzi, S. and Rafieirad, M.** 2017. Evaluating the effect of α -pinene on motor activity, avoidance memory and lipid peroxidation in animal model of Parkinson disease in adult male rats. – Res. J. Pharmacognosy 4: 53-63.
- Hosseini, N., Akbari, M., Ghafarzadegan, R., Ashtiyani, S.C. and Shahmohammadi, R.** 2012. Total phenol, Antioxidant and antibacterial activity of the essential oil and extracts of *Ferulago angulata* ssp. Angulate. – J. Med. Plants 11: 80-89.
- Iranmanesh, F., Gadari, V.R. and Rajabpoor, N.** 2012. Prevalence of post-stroke depression and its relationship with risk factors for stroke. – J Fasa Univ. Med. Sci. 2: 66-70.
- Jamshidi M.A.H., Rezazadeh, S.h., Fathi, F. and Mazanderani, M.** 2010. Study on phenolic and antioxidant activity of some selected plant of Mazandaran province. – J. Med. Plants 9: 177-183.
- Khanahmadi, M. and anfeshan, K.** 2010. Review on iranian medicinal plants with antioxidant properties. – J. Med. Plants 9: 19-32.
- Khosravi, H., Rahnema, M. and Asle-Rousta, M.** 2017. Anxiolytic and antidepressant effects of tarragon (*Artemisia dracunculus* L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress. – Nova Biologica Rep. 4: 1-8.
- Kiziltas, H., Ekin, S., Bayramoglu, M., Akbas, E., Eildirim, S. and Ozgokce, F.** 2017. Antioxidant properties of *Ferulago angulata* and its hepatoprotective effect against N-nitrosodimethylamine-induced oxidative stress in rats. – Pharm. Biol. 55: 888-897.
- Lipton, P.** 1999. Ischemic cell death in brain neurons. – Physiol. Rev. 79: 1431-1568.
- Liu, T., Zhong, S., Liao, X., Chen, J., He, T., Lai, S. and Jia, Y.** 2015. A meta-analysis of oxidative stress markers in depression. – PLoS One 10: e0138904.
- Liu, Y., Long, J. and Liu, J.** 2014. Mitochondrial free radical theory of aging: who moved my premise? . – Geriatr. Gerontol. Int. 14: 740-749.
- Mirzapour, S., Rafieirad, M. and Rouhi, L.** 2015. Hydroalcoholic extract of *Ferulago angulata* improves memory and pain in brain hypoperfusion ischemia in rats. – Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod. 10: e17451.
- Mojtaba, T., Hamid, R. and Ebrahim, S.** 2010. Antimicrobial activity of essential oils of *Ferulago angulata* subsp. – Jundishapur J. Microbiol. 3: 10-14.
- Niatsetskaya, Z.V., Sosunov, S.A., Matsukenich, D., Utkina-Sosunova, I.V., Ratner, V.I., Starkov, A.A. and Ten, V.S.** 2012. The oxygen free radicals originating from mitochondrial complex I contribute to oxidative brain injury following hypoxia-ischemia in neonatal mice. – J. Neurosci 32: 3235-3244.
- Özkan, A., Demirci, B. and Baser, K.** 2008. Composition and antimicrobial activity of essential oil of *Ferulago longistylis* Boiss fruits. – J. Essent Oil Res. 20: 569-573.
- Prie, B.E., Iosif, L., Tivig, I., Stoian, I. and Giurcaneanu, C.** 2016. Oxidative stress in androgenetic alopecia. – J. Med. Life 9: 79-83.
- Rafieirad, M., Sarkaki, A., Hoseini, E., Farbood, Y., Mansouri, S.M.T. and Motamedi, F.** 2011. The Effect of grape seed extract on lipid peroxidation duo to ischemia/hypoperfusion in male rat striatum. – J. Animal Bio. 3: 37-44.
- Rajesh M., Perumal S. and Sellamuthu, M.** 2008. The antioxidant activity and free radical scavenging potential of two different solvent extracts of *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntz, *Ficus bengalensis* L. and *Ficus racemosa* L. – Food Chem. 107: 1000-1007.
- Sharifi, F., Rafieirad, M. and Sazegar, H.** 2015. Effects of *Ferulago angulata* extract against oxidative stress induced by 6-hydroxydopamine in rats. – J. Med. Plants 53: 34-44.
- Skorzewksa, A., Lehner, M., Wislowska-Stanek, A., Turzynska, D., Sobolewska, A., Krzascik, P. and Plaznik, A.** 2015. Midazolam treatment before re-exposure to contextual fear reduces freezing behavior and amygdala activity differentially in high- and low-anxiety rats. – Pharmacol. Biochem. Behav. 129: 34-44.
- Subash, S., Braidy, N., Essa, M.M., Zayana, A.B., Ragini, V., Al-Adawi, S., Al-Asmi, A. and Guillemin, G.J.** 2015. Long-term (15 mo) dietary supplementation with

pomegranates from Oman attenuates cognitive and behavioral deficits in a transgenic mice model of Alzheimer's disease. – Nutrition 31: 223-229.

Wiegand, F., Liao, W., Busch, C., Castell, S., Knapp, F., Lindauer, U., Megow, D., Meisel, A., Redetzky, A., Ruscher, K., Trendelenburg, G., Victorov, I., Riepe, M., Diener H.C. and Dirnagl, U. 1999. Respiratory chain inhibition induces tolerance to focal cerebral ischemia. – J. Cereb. Blood Flow Metab. 19: 1229-1237.

Yang, Z., Weian, C., Susu, H. and Hanmin, W. 2016. Protective effects of mangiferin on cerebral ischemia-reperfusion injury and its mechanisms. – Eur. J. Pharmacol. 771: 145-151.

How to cite this article:

Eidipour, E., Rafieirad, M., Alami Rostami, Sh. and Zangenehnezhad, Z. Anti-depressive effects of hydro-alcoholic extract of Chevilan (*Ferulago angulata* Boiss.) in adult male wistar rat model of ischemia/ hypoperfusion. – Nova Biologica Rep. 2018: 137-143.

عیدی‌پور، ز.، رفیعی‌راد، م.، عالمی‌رستمی، ش. و زنگنه‌نژاد، ز. اثر ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی چویل در مدل ایسکمی/هاپوپرفسیون در موش صحرایی نر ویستار بالغ. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۱۴۳-۱۳۷: ۱۴۳-۱۳۷.