

اثر تنش شوری بر بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی در بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل گیاهی زیره‌سیاه

زهرا روحی^{*}، محمدرضا ایمان‌پور، ولی‌الله جعفری و وحید تقی‌زاده

دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۲؛ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷؛ چاپ: ۱۳۹۵/۳/۳۱

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

^{*}مسئول مکاتبات: zahra.roohi@gau.ac.ir

چکیده. مطالعه حاضر بهمنظور اندازه‌گیری گلوكز، کلسترول و هماتوکریت به عنوان شاخص ارزیابی اثر زیره‌سیاه بر سلامت و مقاومت کپور معمولی نسبت به تنش شوری انجام شد. ماهیان (۲/۴۵۷±۰/۰۵۷ گرم) در چهار گروه با سطوح مختلف صفر، ۰/۰۵، ۱ و ۱/۵٪ زیره‌سیاه تغذیه شدند. بعد از ۵۶ روز تغذیه، به‌منظور سنجش گلوكز، کلسترول و هماتوکریت، خون‌گیری طی پنج مرحله انجام شد (یکبار قبل از تنش و چهار مرحله بعد از تنش). میزان گلوكز، کلسترول و هماتوکریت به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر شوری قرار گرفت. در روز اول پس از استرس، میزان گلوكز و هماتوکریت در همه‌ی تیمارها در مقایسه با میزان آنها قبل از استرس به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. بعد از استرس، میزان کلسترول در همه‌ی تیمارها در مقایسه با قبل از استرس به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. میزان هماتوکریت در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت. در روز اول پس از استرس، میزان گلوكز در گروه‌های تغذیه شده با زیره‌سیاه در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. سطوح گلوكز و هماتوکریت در همه‌ی تیمارها به تدریج از روز سوم کاهش یافت. بعد از استرس، تفاوت معنی‌داری در میزان بازماندگی در بین تیمارها شاهده نشد. با این حال، بیشترین بازماندگی مربوط به ماهیان تیمار شده با زیره سیاه بود. نتایج نشان داد که مکمل غذایی زیره سیاه، اثر مثبتی بر گلوكز، هماتوکریت و مقاومت کپور معمولی نسبت به تنش شوری دارد.

واژه‌های کلیدی. ماهی، رژیم غذایی، خون، استرس، گلوكز

The effect of salinity stress on survival, biochemical and blood parameters in fingerling *Cyprinus carpio* fingerling fed with herbal supplement of *Carum carvi*

Zahra Roohi*, Mohammad Reza Imanpoor, Valiollah Jafari & Vahid Taghizadeh

Received 13.07.2015 / Accepted 06.01.2017 / Published 21.06.2017

Department of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

*Correspondent author: zahra.roohi@gau.ac.ir

Abstract. This study was conducted in order to measure glucose, cholesterol and hematocrit as indicators to evaluate the effect of caraway seeds meal (CSM) on the health and resistance of common carp to salinity stress. To attain this goal, fish (2.457±0.057 g) were divided into four groups fed on diets containing different levels of CSM; 0 (control), 0.5, 1 and 1.5%. After 56 days of feeding, blood samples of the fish were obtained in five stages (once before and four times after stress) to evaluate glucose, cholesterol and hematocrit levels. The experiments indicated that salinity significantly affected glucose, cholesterol and hematocrit. On the first day after stress, the hematocrit and glucose levels were considerably increased in all groups compared with their levels before stress. After stress, cholesterol level significantly decreased in all groups compared to before stress. The level of hematocrit indicated no significant difference among the groups before and after stress. On the first day after stress, the glucose levels significantly increased in treated groups with CSM compared with the control group. The glucose and hematocrit levels were decreased gradually in all groups from the third day on. After stress, no differences were observed for survival rates among the experimental diets. However, the highest survival rate belonged to treated groups with CSM. The overall result indicated that the supplement of CSM has a positive influence on the glucose, hematocrit and resistance of common carp to salinity stress.

Keywords. fish, dietary, blood, stress, glucose

در محدوده مورد نیاز ماهی حفظ شود تا میزان رشد و بازماندگی

آن افزایش یابد (Mohammadi-Makvandi *et al.*, 2012).

ماهیان سازگاری‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تکامل یافته‌ای تحت عنوان پاسخ استرس برای مقابله با این چنین محدودیت‌های دارند، که مانع اثرات زیان‌آور استرس می‌شود و یا آنها را به

مقدمه

عوامل فیزیکوشیمیایی آب تأثیر بسیار زیادی بر رشد، بقاء و متابولیسم ماهی دارد که انحراف از حد مجاز آنها منجر به بروز مشکلاتی در پرورش ماهیان خواهد شد (Chakraborty, 2007). بنابراین، باید سعی شود تا حد امکان عوامل فیزیکوشیمیایی آب

استرس‌زا مانند دستکاری، کیفیت آب و تغییر در میزان دما و شوری آب قرار می‌گیرند (Wendelaar Bonga, 1997). زیره‌سیاه گونه‌ای با پراکنش جهانی و سابقه دارویی از دوران باستان (Jayaprakas & Sambhu, 1996)، در نواحی شمالی خراسان، کرمان و شرق زاگرس می‌روید (Roohi et al., 2015b). دانه زیره‌سیاه فعالیت ضدقارچی و ضدمیکروبی دارد، و می‌تواند احساس نفخ یا سیری مربوط به سوء‌هاضمه را کاهش دهد، که باعث می‌شود برای ارتقاء رشد ماهی استفاده شود. اثرات مثبت این گیاه بر رشد تیلایا (Ahmad & Abdel Tawwab, 2011) و کپور معمولی (Roohi et al., 2015b) تأیید شده است.

در حال حاضر چالش عمدۀ در آبزی‌پروری، بهبود جیره‌های غذایی فرموله شده برای بهینه‌سازی رشد و ارتقاء سلامت ماهیان است (Yousefi et al., 2010). لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر مکمل غذایی زیره‌سیاه بر پاسخ‌های فیزیولوژیک استرس، بهبود روش‌های پرورش تجاری و حفظ ذخایر کپور معمولی در محیط‌های طبیعی است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در تابستان ۱۳۹۲ در مرکز تحقیقات آبزی‌پروری شهید فضلی برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این مطالعه، تعداد ۱۸۰ قطعه ماهی کپور معمولی (۲/۴۵۷±۰/۰۵۷ گرم) از کارگاه تکثیر و پرورش سیجوال در استان گلستان تهیّه و به مدت دو هفته آداتپاسیون انجام شد. آزمایش به صورت کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در هر سطح، به مدت ۸ هفته انجام شد. هر تیمار به میزان ۳٪ وزن بدن، ۴ بار در روز تغذیه شدند. هر دو هفته، ماهیان هر تیمار وزن و مقدار غذاده‌ی براساس آن تنظیم شد. مدفوع و دیگر مواد باقیمانده هر روز صبح از مخازن سیفون شدند. در طول دوره پرورش دمای آب ۲۵±۱ درجه سانتی گراد، اکسیژن محلول در آب ۰/۶۵±۰/۵ میلی-گرم در لیتر، سختی آب ۲۸۰±۱۲ میلی-گرم کربنات کلسیم در لیتر و pH آب ۷/۸±۰/۷ بود. در هر آکواریوم ۱۵ عدد ماهه قرار گرفت. زیره‌سیاه از بازار محلی تهیه و به صورت پودر شده از الک عبور داده شد. چهار تیمار با سطوح مختلف صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ گرم

حداقل می‌رساند (Koeypudsa & Jongjareanjai, 2011). پاسخ‌های فیزیولوژیکی به استرس با توجه به درجه پاسخ، به پاسخ اوّلیه، ثانویه و پاسخ سوم طبقه‌بندی شده است (Goos & Consten, 2002; Ham et al., 2003). پاسخ اوّلیه دریافت یک تغییر حالت توسط سیستم عصبی مرکزی و آزادسازی هورمون‌های استرس، کورتیزول و کاتکولامین‌ها، توسط سیستم آندوکرین به جریان خون است (Najafpour et al., 2012). پاسخ‌های ثانویه به عنوان اثرات استرس رخ می‌دهد که منجر به تغییر در خون، شیمی بافت و تغییرات هماتولوژی مانند قند خون می‌شود (Martinez-Porcas et al., 2009). پاسخ سوم در وضعیت رشد فیزیکی جاندار آشکار می‌شود (Koeypudsa & Jongjareanjai, 2011). بسیاری از این پاسخ‌ها به عنوان شاخص‌های کمی استرس در ماهیان استفاده می‌شود (Ruane et al., 1998).

یکی از شاخص‌های مهم و قابل اطمینان در بررسی وضعیت سلامتی و فیزیولوژیکی ماهیان، سنجش پارامترهای خون آنهاست که از تغذیه، عوامل محیطی و سن اثر می‌پذیرد (Fanouraki et al., 2007). کورتیزول و گلوکز شاخص‌های مناسب فیزیولوژیکی جهت بررسی رخداد استرس در ماهیان هستند که به هنگام وقوع استرس مقادیر آنها افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، پارامترهای هماتولوژیکی می‌تواند به عنوان شاخص‌های شرایط فیزیولوژیک، حضور بیماری و استرس استفاده شوند (Najafpour et al., 2012). بنابراین، مطالعه‌ی پارامترهای هماتولوژیکی و یووژیمیابی، به عنوان شاخص‌های فیزیولوژیکی پاسخ استرس، ابزاری برای تسهیل مدیریت سلامتی ماهیان است (Lermen et al., 2004). کپور معمولی به عنوان یکی از گونه‌های با اهمیت اقتصادی بالا و پر طرفدار در اکثر مناطق کشور کشت می‌شود (Al-Dubakel et al., 2012) و جزء مهم‌ترین ماهیان اقتصادی دریای خزر است. در سال‌های اخیر به دلیل صید بی‌رویه مولدهین، تغییر در شرایط رودخانه‌ها و افزایش آلدگی، جمعیت مولدهین طبیعی کاهش یافته که به منظور بازسازی ذخایر، اقدام به تکثیر نیمه طبیعی این ماهی شده است. یکی از مشکلات عده مربوط به تلفات بچه‌ماهیانی است که از مراکز تکثیر رهاسازی می‌شوند (Olla et al., 1988). همچنین، در طول دوره پرورش و حمل و نقل در معرض عوامل

یک از تیمارهای آزمایش تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. با بررسی هماتوکریت قبل از استرس مشخص گردید که در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. با افزایش شوری میزان هماتوکریت در همه‌ی تیمارها در مقایسه با قبل از تنفس افزایش معناداری نشان داد. با این حال، در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میزان هماتوکریت از روز سوم پس از تنفس، روند کاهشی را نشان داد (جدول ۱). میزان هماتوکریت در روز سوم در بین تیمارها معنی‌دار بود و کمترین میزان هماتوکریت در ماهیان تنفس شده با زیره‌سیاه مشاهده شد. قبل از تنفس شوری، میزان گلوکز در تیمارهای مختلف اختلاف معناداری داشت و کمترین سطح آن در تیمارهای ۱ و ۱/۵٪ زیره‌سیاه مشاهده شد (جدول ۲). اثر استرس در تغییرات گلوکز معنی‌دار بود، به طوری که در روز اول پس از تنفس در مقایسه با میزان آن قبل از تنفس افزایش معناداری نشان داد. در روز اول پس از تنفس، سطوح گلوکز تیمارهای تنفس شده با زیره‌سیاه در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشت. میزان گلوکز در تیمارهای مختلف از روز سوم پس از تنفس در مقایسه با روز اول، به طور معنی‌داری روند کاهشی را نشان داد. این روند کاهش در بین تیمارها تفاوت معناداری نداشت. قبل از تنفس شوری، میزان کلسترول در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری داشت، به طوری که بیشترین میزان کلسترول در گروه شاهد مشاهده شد (جدول ۳). با افزایش شوری میزان کلسترول در همه‌ی تیمارها به جز زیره‌سیاه ۰/۵٪، در مقایسه با قبل از تنفس کاهش معناداری نشان داد، با این حال در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میزان کلسترول بعد از تنفس شوری، روند کاهشی را نشان داد. با این حال، این روند کاهشی بین تیمارها معنی‌دار نبود. در ماهیان تنفس شده با زیره‌سیاه ۰/۵٪، روند کاهشی از روز سوم پس از تنفس شروع شد.

بحث و نتیجه‌گیری

شوری نیز یکی از فاکتورهای زیست‌محیطی است که بر فیزیولوژی، کارایی رشد و جذب غذا در ماهی مؤثر است (Mommsen *et al.*, 1998). از سوی دیگر، مطالعه‌ی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در رابطه با حد تحمل جانوران در برابر فاکتورهای استرس را ارائه دهن (Barton & Iwama, 1991) و اندازه‌گیری آنها به عنوان

زیره‌سیاه در یک کیلوگرم غذای تجاری (انرژی ۳۰۰۱ کیلوکالری) تهیه شد. مواد تشکیل‌دهنده هر تیمار با اضافه کردن مقداری آب گرم ترکیب شده، خمیره‌ای تهیه شده از چربخ گوشت عبور داده شدند و پلت‌های مورد آزمایش ساخته شد. پلت‌های مرطوب در دمای اتفاق به مدت ۲ روز خشک شدند (Mostafa *et al.*, 2009).

پس از ۵۶ روز تغذیه، جهت سنجش اثر زیره‌سیاه اضافه شده به جیره، تیمارها به مدت هفت روز تحت تنفس شوری ppt ۱۳ قرار گرفت و میزان گلوکز، کلسترول، هماتوکریت اندازه‌گیری و درصد بازماندگی آنها طبق فرمول زیر محاسبه شد (Chimezie *et al.*, 2008).

تعداد ماهیان موجود در پایان آزمایش) = درصد بازماندگی

تعداد ماهیان موجود در شروع آزمایش / ۱۰۰


سنجش گلوکز، کلسترول و هماتوکریت

میزان هماتوکریت، کلسترول و گلوکز قبل از تنفس شوری و بعد از انتقال ماءان به شوری مورد نظر طی چهار مرحله (روزهای اول، سوم، پنجم و هفتم پس از تنفس) اندازه‌گیری شد. به منظور آنالیز هماتوکریت، نمونه‌های خون با قطع ساقه دمی با استفاده از لوله‌های موبینه هپارینه و دستگاه هماتوکریت خوان اندازه‌گیری شد. برای آنالیز گلوکزو کلسترول، نمونه‌های خون فوراً در دمای اتفاق سانتریفیوژ (۷ دقیقه، ۵۰۰۰ rpm) و پلاسمما جدا شده و در دمای ۲۰- درجه‌سانانی گراد تا زمان آنالیز نگهداری شد. میزان گلوکز و کلسترول با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر و کیت‌های تجاری (شرکت پارس آزمون، ایران) اندازه‌گیری شد (Roohi *et al.*, 2015a).

تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن جهت مقایسه میانگین‌ها انجام شد. اختلاف بین میانگین‌ها در تیمارهای مختلف با سطح اطمینان $P < 0.05$ تعیین گردید. برای عملیات آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. تمام داده‌های متن براساس میانگین \pm انحراف معیار، محاسبه شدند.

نتایج

نتایج مربوط به بازماندگی تیمارهای مختلف بعد از تنفس شوری (شکل ۱) نشان داد که ماهیان تنفس شده با مکمل غذایی زیره‌سیاه بیشترین بازماندگی را داشتند. با این حال، از لحاظ آماری بین هیچ-



شکل ۱- نرخ بازماندگی (میانگین±انحراف معیار) کپور معمولی تغذیه شده با زیره سیاه تحت تنش شوری (۱۳ ppt).

Fig. 1. Survival rate (mean±SD) of common carp fed with caraway under salinity stress (13 ppt).

جدول ۱- غلظت هماتوکریت (میانگین±انحراف معیار) در بچه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با زیره سیاه تحت تنش شوری.

Table 1. Hematocrit levels (mean±SD) in common carp fingerlings fed with caraway under salinity stress.

زیسته سیاه	٪/۱	زیسته سیاه	٪/۱	زیسته سیاه	٪/۰/۵	شاهد	هماتوکریت (%)
۲۹/۷±۲/۴۰۴ ^{aC}	۳۱/۱۵±۰/۹۱۹ ^{aC}	۲۸/۸۵±۲/۸۹۹ ^{aC}	۳۱/۹±۰/۱۴۳ ^{aD}	قبل از تنش			
۵۵/۰±۲/۱۲۱ ^{aA}	۶۰/۰±۲/۸۲۸ ^{aA}	۵۴/۵±۲/۱۲۱ ^{aA}	۵۸/۵±۰/۷۰۰ ^{aA}	روز اول پس از تنش			
۴۷±۲/۸۲۸ ^{cB}	۴۴/۵±۰/۷۰۰ ^{bCB}	۴۷/۵±۰/۷۰۰ ^{abAB}	۵۰/۱±۰/۱۴۳ ^{aB}	روز سوم پس از تنش			
۴۶/۲۰±۲/۴۷ ^{aB}	۴۴/۷۵±۰/۱۶۱ ^{aB}	۴۵/۵±۰/۲۱۷ ^{aAB}	۴۴±۰/۲۸۳ ^{aC}	روز پنجم پس از تنش			
۴۳±۲/۸۳ ^{aB}	۴۰/۳۸±۰/۳۶ ^{aB}	۴۱/۵±۰/۲۰۰ ^{aB}	۴۴/۸۷±۰/۲۶۰ ^{aC}	روز هفتم پس از تنش			

حروف انگلیسی کوچک غیر مشابه در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ غیر مشابه در هر سوتون یا نگر اختلاف معنی دار در سطح $p<0.05$ داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار است.Different lowercase letters in the same and different uppercase letters in the same column indicate significant difference ($p<0.05$); values are presented as the mean ± SD.

جدول ۲- غلظت گلوکز (میانگین±انحراف معیار) در بچه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با زیره سیاه تحت تنش شوری.

Table 2. Glucose levels (mean±SD) in common carp fingerlings fed with caraway under salinity stress.

٪/۱۰ سیاه	٪/۱	٪/۰/۵	شاهد	گلوکز (mg. dl ⁻¹)
۱۰/۳/۷۸±۲/۳۲ ^{bB}	۱۰/۸/۲۸±۱/۷۹ ^{bB}	۱۱۱/۱۴±۰/۲۱ ^{abC}	۱۱۷/۴۷±۴/۹۴ ^{aB}	قبل از تنش
۱۹۶±۵/۶۶ ^{aA}	۲۷۷/۸۳±۱۵/۲۱ ^{bA}	۳۲۴/۰±۲/۱۲۱ ^{aA}	۲۱۲/۵±۰/۱۷/۶۸ ^{cA}	روز اول پس از تنش
۱۱۹±۱۰/۵۶ ^{aB}	۱۳۹/۶±۱۳/۵۸ ^{aB}	۱۵۵/۸۴±۱۲/۵ ^{aB}	۱۲۸/۳۷±۶/۴۵ ^{aB}	روز سوم پس از تنش
۱۲۰±۲/۱۵ ^{aB}	۱۲۵±۱۴/۱۴ ^{aB}	۱۴۸/۷۶±۱۴/۳۵ ^{aB}	۱۲۳/۵±۰/۱۹ ^{aB}	روز پنجم پس از تنش
۱۱۸/۷۷±۱۳/۰ ^{aB}	۱۳۲/۲۷±۱۰/۰۹ ^{aB}	۱۳۳/۷۷±۱۲/۹۹ ^{aBC}	۱۲۷/۹۱±۹/۷۷ ^{aB}	روز هفتم پس از تنش

حروف انگلیسی کوچک غیر مشابه در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ غیر مشابه در هر سوتون یا نگر اختلاف معنی دار در سطح $p<0.05$ داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار است.Different lowercase letters in the same and different uppercase letters in the same column indicate significant difference ($p<0.05$); values are presented as the mean ± SD.

جدول ۳- تغییرات کلسترول (میانگین±انحراف معیار) در بچه ماهیان کپور معمولی تغذیه شده با زیره سیاه تحت تنش شوری.

Table 3. Cholesterol levels (mean±SD) in common carp fingerlings fed with caraway under salinity stress.

٪/۱۰ سیاه	٪/۱	٪/۰/۵	شاهد	کلسترول (mg. dl ⁻¹)
۱۸۰/۸۳±۱/۱۸ ^{abA}	۱۷۶/۶۷±۴/۷۱ ^{bA}	۱۸۵/۸۳±۵/۸۹ ^{abA}	۲۱۰/۴۲±۱۵/۹۱ ^{aA}	قبل از تنش
۱۶۷/۰۲±۴/۲۴ ^{abB}	۱۵۳/۵۰±۴/۹۵ ^{bBC}	۱۷۴/۹۴±۶/۹۸ ^{aA}	۱۶۵/۱۰±۰/۷۸ ^{abB}	روز اول پس از تنش
۱۵۸/۳۹±۷/۹۴ ^{aB}	۱۶۷/۵۰±۳/۵۴ ^{aAB}	۱۶۹/۴۴±۷/۸۶ ^{aA}	۱۶۱/۸±۶/۸ ^{aB}	روز سوم پس از تنش
۱۵۹/۲۲±۴/۵۰ ^{aB}	۱۳۷/۵۱±۹/۱۹ ^{aBD}	۱۴۷/۱۴±۵/۲۷ ^{aB}	۱۵۵/۹۱±۵/۴۸ ^{aB}	روز پنجم پس از تنش
۱۲۵/۰۹±۷/۲۴ ^{aC}	۱۲۶/۱۷±۷/۳۸ ^{aD}	۱۲۱/۲۶±۶/۶۸ ^{aC}	۱۳۲/۱۹±۴/۵۹ ^{aC}	روز هفتم پس از تنش

حروف انگلیسی کوچک غیر مشابه در هر ردیف و حروف انگلیسی بزرگ غیر مشابه در هر سوتون یا نگر اختلاف معنی دار در سطح $p<0.05$ داده ها به صورت میانگین±انحراف معیار است.Different lowercase letters in the same and different uppercase letters in the same column indicate significant difference ($p<0.05$); values are presented as the mean ± SD.

نشان داد که تصور می‌شود این تغییرات بدلیل سازگار شدن ماهی به محیط جدید حاصل شده است. نتایج به دست آمده با مطالعات Cnaani و همکاران (2004) در تیلاپیا و Hoseini و Tarkhan (2013) در ماهی قرمز مطابقت دارد.

در این مطالعه، میزان کلسترول بعد از تنفس شوری روند کاهشی داشت. ماهیان تغذیه شده با زیره‌سیاه ۱٪ نسبت سایر تیمارها روند کاهشی آرام‌تری نشان داد. کاهش سطوح کلسترول ناشی از مصرف کلسترول ذخیره شده، در جریان خون و سایر بخش‌های لبیدی برای مقابله استرس و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آنهاست (Singh et al., 2010). این نتایج با مطالعه Singh و همکاران (2010) بر ماهی *Channa punctatus* مطابقت دارد. Maita و همکاران (1998a)، ارتباط بین سطوح لبیدهای پلاسمای و مقاومت به پاتوژن در تن‌زرد باله و قزل‌آلای رنگین کمان را نشان دادند. سطوح لبیدهای پلاسمای در ماهیان تحت تأثیر رژیم غذایی و استرس پس از قرار گرفتن در معرض محیط‌های کم اکسیژن قرار می‌گیرد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که کلسترول پلاسمای می‌تواند شاخصی برای سلامتی و ایمنی ماهیان باشد. به‌طور متداول در مطالعات تغذیه‌ای، تنفس شوری برای تعیین کیفیت بچه‌ماهیان استفاده می‌شود (Imanpoor & Roohi, 2015).

برای سلامتی و ایمنی ماهیان بازماندگی نشان دهنده ایمنی در مقابل عوامل بیماری‌زا و استرس-های محیطی است (Salze et al., 2008). نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مکمل گیاهی زیره‌سیاه بر بقای بچه‌ماهیان کپور و معمولی تأثیر ندارد. مطابق با نتایج این مطالعه، Imanpoor و Roohi (2015) گزارش کردند که مکمل گیاهی سنگروویت بر میزان بازماندگی بچه‌ماهیان کلمه تحت تنفس شوری تأثیری نداشته است.

به‌طور کلی، با افزایش شوری، ماهی نیاز بیشتری به اکسیژن پیدا می‌کند و تغییراتی در فیزیولوژی ماهی رخ می‌دهد تا انرژی لازم برای تنظیم فشار اسمزی فراهم شود (Yagi & Ceccaldi, 1990). علاوه‌بر این، ماهیان در پاسخ به استرس حاد منابع متابولیک و ایمنی (گلوکز) را به کار می‌گیرند که فقط برای مدت کوتاهی میزان آنها بالا باقی می‌ماند. به خوبی شناخته شده است که در سیستم‌های پرورش ماهی، اوّلین یا دومین روز بعد از دستکاری (استرس)، ماهیان از لحاظ بیماری عفونی و شیوع بیماری‌های

شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ‌های ثانویه استرس به طور Chen et al., 2004; Koeypudsa et al., 2007 فاکتورهای متعددی مانند سن، جنسیت، اندازه، محیط و شرایط فیزیولوژیکی بر پاسخ‌های Tanck et al., 2002; Sowunmi, 2003; Mohammadi Zarejabad et al., 2009 بخشن از حجم کل خون که توسط گلبول‌های قرمز اشغال می‌شود همان‌گرایی نام دارد. این مقدار یک کمیت نسبی بوده و بر حسب درصد بیان می‌شود. همان‌گرایی خون به عنوان یک شاخص مهم و رایج در تعیین سلامت و بیماری ماهیان مورد استفاده قرار می‌گیرد (Houston & Rupert, 1997). بر اساس برخی مطالعات، تحت تأثیر استرس‌های فیزیکی میزان همان‌گرایی در ماهی افزایش می‌یابد (Barton et al., 1985) که این افزایش ممکن است به علت جذب آب در گلبول‌های قرمز باشد (Milligan & Wood, 1982). مطالعه حاضر همانند نتایج حاصله از آزمایش Malakpour Kolbadinezhad و همکاران (2012) بر ماهی کلمه نشان می‌دهد که میزان همان‌گرایی در روز اوّل پس از تنفس در مقایسه با قبل از تنفس افزایش می‌یابد. همچنین با مطالعه Yildiz و Uzbilek (2001) که نشان دادند افزایش شوری سبب افزایش میزان همان‌گرایی در ماهی کپور علفخوار گردید، مطابقت دارد. افزایش میزان همان‌گرایی را نیز جهت افزایش منابع اکسیژن برای اندام‌های اصلی در پاسخ به درخواست متابولیک بیشتر در طی استرس ایجاد شده می‌توان توجیه نمود (Ruane et al., 1998).

از پاسخ‌های ثانویه استرس که اندازه گیری آن بسیار متداول است، اندازه گیری گلوکز خون به عنوان معیار اندازه گیری غیرمستقیم هورمون استرس است (Makvanid et al., 2012). در این مطالعه، سطوح گلوکز ماهیان تحت تنفس شوری در مقایسه با قبل از تنفس، افزایش یافت، به طوری که بیشترین مقدار آن در ماهیان تیمار شده با مکمل غذایی زیره‌سیاه مشاهده شد که نشان دهنده واکنش فیزیولوژیک ثانویه ماهیان نسبت به شرایط استرس زا است (Mommsen et al., 1998). افزایش میزان گلوکز را نیز جهت تأمین انرژی برای مقابله با استرس ایجاد شده می‌توان توجیه نمود. نکته مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود، آن است که میزان گلوکز تمام تیمارها در روز سوم پس از تنفس روند کاهشی را

REFERENCES

- Ahmad, M.H. and Abdel Tawwab, H.** 2011. The use of caraway seed meal as a feed additive in fish diets: growth performance, feed utilization, and whole-body composition of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fingerlings. – Aquaculture 314: 110-114.
- Al-Dubakel, A.Y., Al-Mhawe, B.H., Majeed, M.F. and Shaeyal, L.W.** 2012. Preliminary study on the effect of dietary black seed (*Nigella sativa*) on growth and blood glucose of common carp (*Cyprinus carpio*) fingerlings. – J. Agri. Res. 1: 41-51.
- Barton, B.A. and Iwama, G.K.** 1991. Physiological changes in fish from stress in aquaculture with emphasis on the response and effects of corticosteroids. – Ann. Rev. Fish Diseases 1: 2-36.
- Barton, B.A., Weiner, G.S. and Schreck, C.B.** 1985. Effect of prior acid exposure on physiological responses of juvenile rainbow trout (*Salmo gairdneri*) to acute handling stress. – Can. J. Fish. Aquat. Sci. 42: 710-717.
- Chakraborty, B.K. and Mirza, M.J.A.** 2007. Effect of stocking density on survival and growth of endingered bata (*Labeo bata*) in nursery ponds. – Aquaculture 265: 156-162.
- Chen, G.A., Wooster, G.A. and Bowser, P.R.** 2004. Comparative blood chemistry and histopathology of tilapia infected with *Vibrio vulnificus* or *Streptococcus iniae* or exposed to carbon tetrachloride, gentamicin or copper sulfate. – Aquaculture 239: 421-443.
- Chimezie, A., Ibukun, A., Teddy, E. and Francis, O.** 2008. HPLC analysis of nicotinamide, pyridoxine, riboflavin and thiamin in some selected food products in Nigeria. – Afr. J. Pharm. 2: 29-36.
- Cnaani, A., Tinman, S., Avidar, Y., Ron, M. and Hulata, G.** 2004. Comparative study of biochemical parameters in response to stress in *Oreochromis aureus*, *Oreochromis mossambicus* and two strains of *Oreochromis niloticus*. – Aquaculture Res. 35: 1434-1440.
- Fanouraki, E., Divanach, F. and Pavlidis, M.** 2007. Baseline values for acute and chronic stress indicators in sexually immature red porgy (*Pagrus pagrus*). – Aquaculture 265: 294-304.
- Goos, H.J.T. and Consten, D.** 2002. Stress adaptation, cortisol and pubertal development in the male common carp (*Cyprinus carpio*). – Mol. Cell. Endocrinol. 197: 105-116.
- Ham, E.H.V., Anholt, R.D.V., Kruitwagen, G., Imsland, A.K., Foss, A., Sveinsbo, B.O., Fitzgerald, R., Parpoula, A.C., Stefansson, S.O. and Bonga, S.E.W.** 2003. Environment affects stress in exercised turbot. – Comp. Biochem. Phys. A 136: 525-538.
- Hoseini, S.M. and Tarkhani, R.** 2013. Serum biochemical characteristics of *Carassius auratus* following short-term formalin or NaCl treatment. – Int. J. Aqua. Biol. 1: 14-21.
- Cnaani et al.** 2004. گوناگون و عوامل بیماری‌زا بسیار حساس هستند (Cnaani et al., 2004).
- با توجه به نتایج کسب شده از این تحقیق، مشخص می‌شود که مکمل غذایی زیره سیاه اثر مثبت و مطلوبی در بروز پاسخ به استرس در کپور معمولی دارد، بطوری که توانایی این ماهی را جهت مقابله با استرس شوری افزایش داد.

سپاسگزاری

بدین‌وسیله از حمایت‌های دکتر عباس روحی و مهندس هاشم روحی تشکر و قدردانی می‌نماییم.

- Houston, A.H. and Rupert, R.** 1997. Immediate response of hemoglobin system of gold fish (*Cyprinus auratus*) to tempera change. – *Can. J. Zool.* 54: 1731-1741.
- Imanpoor, M.R. and Roohi, Z.** 2015. Effects of sangro-vit-supplemented diet on growth performance, blood biochemical parameters, survival and stress resistance to salinity in the Caspian roach (*Rutilus rutilus*) fry. – *Aquaculture Res.*, doi: 10.1111/are.12737.
- Jayaprakas, V. and Sambhu, C.** 1996. Growth response of white prawn (*Penaeus indicus*) to dietary L-carnitine. – *Asian Fish. Sci.* 9: 209-219.
- Koepudsa, W. and Jongjareanhai, M.** 2011. Impact of water temperature and sodium chloride (NaCl) on stress indicators of hybrid catfish (*Clarias gariepinus* × *Clarias Macrocephalus*). – *Song. J. Sci. Technol.* 33: 369-378.
- Koepudsa, W., Kitkamthorn, M., Sadu, K. and Sailsuta, A.** 2007. Effect of short-term anoxia (DO 0 ppm, 3 hours) and long-term hypoxia (DO 3-4ppm, 90 days) on haematology of catfish. – *J. Health. Res.* 21: 13-24.
- Lermen, C.L., Lappe, R., Crestani, M., Vieira, V.P., Gioda, C.R., Schetinger, M.R.C., Baldisserotto, B., Moraes, G. and Morsch, V.M.** 2004. Effect of different temperature regimes on metabolic and blood parameters of silver catfish (*Rhamdia quelen*). – *Aquaculture* 239: 497-507.
- Makyanid, H., Khodadadi, M., Keyvanshokoh, S. and Mohammadi-makvandi, Z.** 2012. Effect of salinity stress on hormone of cortisol and glucose of *Ctenopharyngodon idella*. – *J. Aquat. Fish.* 2: 77-84.
- Martinez-Porcha, M., Martinez-Cordova, L. and Ramos-Enriquez, R.** 2009. Cortisol and glucose: reliable indicators of fish stress? – *Pan-American J. Aquat. Sci.* 4: 158-178.
- Maita, M., Aoki, H., Yamagata, Y., Satoh, K.I., Okamoto, N. and Watanabe, T.** 1998a. Plasma biochemistry and disease resistance in yellowtail fed a non-fish meal diet. – *Fish Pathol.* 33: 59-63.
- Maita, M., Satoh, K.I., Fukuda, N., Okamoto, N. and Ikeda, Y.** 1998b. The influence of the dissolved oxygen on levels of plasma components in yellowtail. – *Nip. Suis. Guk.* 64: 288-289.
- Malakpour Kolbadinezhad, S., Hajimoradloo, A., Ghorbani, R., Joshaghani, H. and Wilson, J.M.** 2012. Effects of gradual salinity increase on osmoregulation in Caspian roach (*Rutilus caspicus*). – *J. Fish Biol.* doi:10.1111/j.1095-8649.2012.03317.x.
- Milligan, C.L. and Wood, C.M.** 1982. Disturbances in hematolgy, fluid volume distribution and circulatory function associated with low environmental pH in the rainbow trout (*Salmo gairdneri*). – *J. Exp. Biol.* 99: 397-415.
- Mohammadi-Makvandi, Z., Kochin, P., Zanosi, P.** 2012. Study of effects of salinity on levels of hemogolbin and hematocrit of sliver carp fingerling (*Hypophthalmichthys molitrix*). – *J. Wetl. Ecobiol.* 7: 11-17.
- Mohammadi Zarejabad, A., Jalili, M.A., Sudagar, M. and Darvish Bastami, K.** 2009. Haematology of great sturgeon (*Huso huso*) juvenile exposed to brakish water environment. – *Comp. Clin. Pathol.* doi 10.1007/s00580-009-0888-6.
- Mommsen, T.P., Vijayan, M.M. and Moon, T.W.** 1998. Cortisol in teleosts: dynamics, mechanisms of action and metabolic regulation. – *Rev. Fish Biol. Fish.* 9: 211-268.
- Mostafa, A.Z.M., Ahmad, M.H., Mousallamy, A. and Samir, A.** 2009. Effect of using dried fenugreek seeds as natural feed additive on growth performance, feed utilization, whole-body composition and entropathogenic *Aeromonas hydrophila*-challing of mono sex Nile tilapia fingerlings. – *Aust. J. Bas. Appl. Sci.* 3: 1234-1245.
- Najafpour, B., Imanpoor, M.R. and Shabani, A.** 2012. Effects of *Rheum palmatum* root extract on the blood parameters in responses to two high heat stress and lipid oxidation of *Rutilus frisii kutum*. – *Glob. Veterin.* 8: 197-204.
- Olla, B.L., Davis, M.W. and Ryer, C.H.** 1998. Understanding how the hatchery environment represses or promotes the development of behavioral survival skills. – *Bullet. Mari. Sci.* 62: 531-550.
- Roohi, Z., Imanpoor, M.R., Jafari, V. and Taghizadeh, V.** 2015a. The use of fenugreek seed meal in fish diets: growth performance, haematological and biochemical parameters, survival and stress resistance of common carp (*Cyprinus carpio* L.). – *Aquaculture Res.* 46: 1-7.
- Roohi, Z., Imanpoor, M.R., Jafari, V. and Taghizadeh, V.** 2015b. Effect of different levels of caraway on growth performance and some blood parameters in common carp (*Cyprinus carpio*). – *J. Anim. Environ.* 7: 105-112.
- Ruane, N.M., Wendelaar Bonga, S.E. and Balm, P.H.M.** 1998. Differences between rainbow trout and brown trout in the regulation of the pituitaryinterrenal axis and physiological performance during confinement. – *Gen. Comp. Endocrin.* 115: 210-219.
- Salze, G., Mclean, E., Schward, M.H. and Craig, S.R.** 2008. Dietary mannan oligosaccharide enhances Salinity tolerance and gut development of larval cobia. – *Aquaculture* 274: 148-150.
- Singh, A.P., Singh, S., Bhartiya, P. and Yadav, K.** 2010. Toxic effect of phorate on the serum biochemical parameters of snake headed fish *Channa punctatus*. – *Adv. Biores.* 1: 177-181.
- Sowunmi, A.A.** 2003. Hematology of the African catfish (*Clarias gariepinus*) from Eleiyele Reservoir, Ibadan South-West, Nigeria. – *Zool.* 2: 85-91.
- Tanck, M.W.T., Booms, G.H.R., Eding, E.H., Bonga, S.E. and Komen, J.** 2000. Cold shocks: a stressor for common carp. – *J. Fish. Biol.* 57: 881-894.
- Wendelaar Bonga, S.E.** 1997. The stress response in fish. – *Physiological Reviews* 77: 591-625.
- Yagi, H. and Ceccald, J.H.** 1990. Combind influence of temperature and salinity oxygen consumption of the larval of the pink shrimp (*Palaemon sersatus*). – *Aquaculture* 86: 77-92.

Yildiz, H.Y. and Uzbilek, M.K. 2001. The evaluation of secondary stress response of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) after exposing to the saline water. – Fish. Physiol. Biochem. 25: 287-292.

Yousefi, M., Abtahi, B., Abedian Kenari, A.M. 2010. Effects of captivity and handling stresses on cortisol and glucose levels in giant sturgeon juveniles fed with nucleotide contained diets. – J. Fish. 63: 147-159.

How to cite this article:

Roohi, Z., Imanpoor, M.R., Jafari, V. and Taghizadeh, V. 2017. The effect of salinity stress on survival, biochemical and blood parameters in fingerling *Cyprinus carpio* fingerling fed with herbal supplement of *Carum carvi*. – Nova Biol. Rep. 4: 47-54.

روحی، ز.، ایمانپور، م.ر.، جعفری، و. و تقیزاده، و. ۱۳۹۶. اثر تنش شوری بر بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی در بچه‌ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) تغذیه شده با مکمل گیاهی زیره سیاه. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۴: ۴۷-۵۴.