

جداسازی و شناسایی باسیلوس مولد آلفا-امیلاز گرمادوست: بهینه‌سازی تولید و بررسی فعالیت و پایداری دمایی

سعیده افريشم، ارسلان بدوي دلفارد^{*} عبدالحميد نمکي شوشتري، زهرا كرمي و سعيد ملک آبادي

دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۹ / پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۳ / چاپ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی کرمان، کرمان، ایران

*نویسنده مسئول: badoei@uk.ac.ir

چکیده. آلفا-امیلازها، مهم‌ترین و پرکاربردترین آمیلازها در صنعت نشاسته هستند. در میان آلفا-امیلازها، انواع گرمادوست بهدلیل پایداری و فعالیت در دماهای بالا مهم‌ترند. این آنزیم‌ها به‌وسیله میکرووارگانیسم‌های گرمادوست از جمله باکتری‌ها تولید می‌شوند. آلفا-امیلازها گرمادوست در صنایع مختلف از جمله فرآوری نشاسته، مواد شوینده و سوخت زیستی کاربرد دارند. در این تحقیق، باکتری‌های مولد آلفا-امیلاز گرمادوست از چشم‌های آب گرم روتاستی گروه واقع در استان کرمان شناسایی و جداسازی شدند. براساس نتایج غربال‌گری در محیط اختصاصی مایع و جامد، سویه AT59 به‌منزله سویه برتر انتخاب شد. بررسی‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی 16S rDNA نشان داد این سویه به جنس باسیلوس تعلق دارد و گرم مثبت، کاتالاز مثبت، هیدرولیز-کننده کاژین و تخمیر-کننده قندهای لاکتوز و ساکاروز است. نتایج بهینه‌سازی محیط تولید آنزیم نشان داد در میان منابع کربن، نیتروژن و یون تحت بررسی، نشاسته (۱ گرم بر لیتر)، ژلاتین (۲ گرم بر لیتر) و سولفات مینیزم (یک گرم بر لیتر)، بیشترین اثر افزایشی را بر تولید آلفا-امیلاز سویه AT59 داشته‌اند. علاوه‌بر این، بیشترین تولید آنزیم این سویه در محیطی با pH ۵ به‌دست آمد. این آلفا-امیلاز به ترتیب بیشترین فعالیت و پایداری را در دماهای ۸۰ و ۷۰ درجه سانتی‌گراد داشته‌اند. این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند این آنزیم پتانسیل زیادی برای استفاده در صنعت نشاسته دارد.

واژه‌های کلیدی. آنزیم‌های گرمادوست، تولید، چشم‌های آب گرم، غربال‌گری

Isolation and identification of *Bacillus* producing thermophilic alpha-amylase: production optimization and investigation of the activity and stability of enzyme

Saideh Afrisham, Arastoo Badoei-Dalfard*, Abdolhamid Namaki-Shoushtari, Zahra Karami &

Saeid Malekabadi

Received 19.08.2016 / Accepted 04.12.2017 / Published 19.03.2018

Department of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

*Correspondent author: badoei@uk.ac.ir

Abstract. Alpha-amylases are the most important amylases used in industry. Among them, thermophilic alpha-amylases are of particular importance, which is due to their activity and stability in high temperatures. These enzymes produced by thermophile micro-organisms including bacteria. These thermophilic alpha-amylases are used in various industries such as processing of starch as well as production of detergents and biofuels. In this research, the bacteria which produce the thermophilic alpha-amylases were isolated and characterized in hot springs of Gorooh village in Kerman province. According to the results of screening on the specific liquid and solid media, AT59 was selected as the best strain. Morphological and biochemical characterization of the isolated strain indicated that it belonged to *Bacillus* sp. and was gram-positive, catalase positive, casein hydrolyzing and acid producing from lactose and sucrose. The results obtained from the optimization of the enzyme production medium showed that among the carbon, nitrogen and ion sources investigated, starch (1 gr/l), gelatin (2 g/l) and magnesium sulfate (1 g/l) had the most increasing effect on the production of AT59 alpha-amylase. Moreover, the highest enzyme production was obtained at pH 5. This enzyme also demonstrated the highest degree of activity and stability in 80 and 70 °C, respectively. These findings suggested that this enzyme has a considerable potential for use in starch industry.

Keywords. hot spring, production, screening, thermophilic enzymes

مقدمه

محیط کشت از جمله منابع کربن و نیتروژن، مواد معدنی و همچنین عوامل فیزیکی همچون pH و دمای انکوباسیون قرار دارد (Babu & Satyanarayana, 1995). در مقایسه با میکرووارگانیسم‌های مزو菲尔 و حتی سرمادوست، مطالعات کمتری درباره جداسازی و غربالگری سویه‌های گرمادوست، محیط رشدشان و نیز بهینه‌سازی تولید آنزیم آنها صورت گرفته است (Asgher et al., 2007).

هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی سویه‌های باکتریایی گرمادوست از چشمه‌های آب گرم استان کرمان، بهمنظور تولید آنزیم آلفا آمیلاز با قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی، بوده است. در این مطالعه شرایط بهینه برای تولید آنزیم به دست آمده نیز تعیین شد.

مواد و روش‌ها

نمونه‌برداری

در این تحقیق، چشمه‌های آب گرم روستای گروه از توابع بخش جبالارز شهرستان جیرفت در استان کرمان جهت نمونه‌برداری انتخاب شدند. نمونه‌های آب و رسوبات از دو چشمه موجود در این منطقه با دمای تقریبی ۷۰ درجه سانتی گراد، در داخل فالکون-های استریل جمع‌آوری شد و بهمنظور حفظ دمای موجود در چشمه‌ها، فالکون‌ها در داخل فلاسک به آزمایشگاه منتقل شدند.

جداسازی و غربالگری سویه‌های باکتریایی مولد آلفا آمیلاز
به‌منظور جداسازی سویه‌های باکتریایی با توانایی هیدرولیز نشاسته، یک میلی‌لیتر از نمونه‌های جمع‌آوری شده پس از رقیق‌سازی متواتی به محیط‌های نشاسته آگار حاوی یک درصد نشاسته محلول، ۰/۲ درصد عصاره مخمر، ۰/۵ درصد پیتون، ۰/۱ درصد سولفات‌منزیم، ۰/۱ درصد سدیم کلرید و ۰/۰۲ درصد کلسیم کلرید و ۱/۵ درصد آگار تلقیح و این محیط‌ها ۷۲ ساعت در دستگاه انکوباتور با دمای ۵۵ درجه سانتی گراد قرار داده شدند (Oziengbe & Onilude, 2012). بعد از این مدت، تعدادی از کلنی‌های رشدیافتہ روی این محیط‌ها انتخاب و مجدداً روی محیط نشاسته آگار کشت داده شدند و ۷۲ ساعت در ۵۵ درجه سانتی گراد انکوبه شدند. بعد از گذشت ۷۲ ساعت، پلیت‌ها در محلول لوگول غوطه‌ور شدند و کلنی‌های دارای هاله شفاف به منزله سویه مولد آلفا آمیلاز شناخته شدند (Afrisham et al., 2010; Ahmadi et al., 2010).

میکرووارگانیسم‌های گرمادوست موجوداتی هستند که با رشد بهینه در دماهای بالا (بالای ۵۵ درجه سانتی گراد) سازگارند و از مکان‌های دریایی و خاکی با درجه حرارت بالا جدا شده‌اند. رایج‌ترین این مکان‌ها چشمه‌های آب گرم و بیابان‌ها هستند (Antranikian & Egorova, 2007). گرمادوست منبعی از آنزیم‌هایی شناخته می‌شوند که هم از نظر شیمیایی و هم از نظر فیزیولوژیکی مقاومت بالایی نشان داده (Haki & Rakshit, 2003) و قادرند واکنش‌های شیمیایی را در دماهای بالاتری نسبت به آنزیم‌های میکرووارگانیسم‌های مزو菲尔 کاتالیز کنند. علاوه‌بر این، آنزیم‌های به دست آمده از گرمادوست‌ها ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری همچون پایداری زیاد در مقابل حلال‌های آلی، pH های شدیداً قلیایی و شدیداً اسیدی و مواد شوینده ارائه می‌دهند (Zeikus et al., 1998). از نکات مهم درباره میکرووارگانیسم‌های گرمادوست توانایی تولید آنزیم‌های آمیلولیتیک گرمادوست با کارایی بالا است که در فرآوری نشاسته و تولید قند، صنعت نساجی و همچنین مواد شوینده کاربرد دارند و مهم‌ترین آمیلازهای صنعتی هستند که به طور تصادفی پیوند (۱→۴) بین واحدهای گلوكز مجاور هم را در زنجیره خطی آمیلوز در کربوهیدرات نشاسته را می‌شکافند (Chandra et al., 2010). تولید آلفا آمیلازهای گرمادوست در صنایع مختلف، خطر آلدگی ناشی از میکرووارگانیسم‌های مزو菲尔 و نیز هزینه‌های سردکردن اضافی را کاهش می‌دهد و به طور ویژه در صنعت فرآوری نشاسته، افزایش در ضربی انتشار سوپسترا، حلالت بهتر سوپسترا و محصولات و ویسکوزیته پایین‌تر (اجازه پمپاژ و مخلوط کردن سریع سوپسترا را می‌دهد) را به دنبال دارد (Kristjanson, 1989). تولید تجاری آلفا آمیلازهای مقاوم به گرمای به طور گسترده به وسیله اعضای جنس باسیلوس از جمله *Bacillus stearothermophilus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens* و *Bacillus licheniformis* صورت گرفته است (Souza, 2010). با توجه به اهمیت صنعتی آمیلازهای در سال‌های اخیر، جداسازی سویه‌های باکتریایی جدید با ویژگی‌های مطلوب بسیار مهم قرار گرفته است. تولید آلفا آمیلازهای میکروبی به میزان زیادی تحت تأثیر ترکیبات

پایگاه اطلاعاتی Gene Bank به کمک نرم افزار MEGA4 با روش neighbor joining ترسیم شد (Tamura *et al.*, 2007).

محیط تولید آنژیم

در ابتدا، یک لوب پر از کلنجی باکتری مورد نظر به ۲۰ میلی لیتر محیط نوترینت براث تلقیح و برای ۱۸-۲۴ ساعت در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس، ۱۰ درصد (۲ میلی لیتر) از محیط کشته ۱۸-۲۴ ساعت به محیط تولید حاوی یک گرم نشاسته، یک گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات، ۲ گرم تریپتون، ۲ گرم سولفات آمونیوم، ۰/۰۵ گرم سولفات مینیزیم، ۰/۰۵ گرم کلسیم کلرید و ۳/۱۳ گرم دی سدیم هیدروژن فسفات اضافه و ۷۲ ساعت در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد با دور ۱۶۰ rpm انکوبه شد (Samie *et al.*, 2012).

رسم منحنی استاندارد گلوکز

برای اندازه گیری مقدار گلوکز تولید شده درنتیجه فعالیت آلفا آمیلاز، از منحنی استاندارد گلوکز استفاده می شود. برای رسم این منحنی، ابتدا محلول استوک ۰/۱ درصد از گلوکز در آب مقطر تهیه شد، سپس در داخل ۵ لوله آزمایش حجم های ۰/۲، ۰/۶، ۰/۸ و ۰/۰۶ میلی لیتر از این محلول ریخته شد و با استفاده از آب مقطر به حجم یک میلی لیتر رسانده شد. همچنین در یک لوله یک میلی لیتر آب مقطر به مثابه شاهد ریخته شد. به هر کدام از لوله ها ۲ میلی لیتر از معرف دی نیتروسالیسیلیک (DNS) اضافه، به خوبی تکان داده شد و سپس مخلوط حاصل ۵ دقیقه در آب جوش قرار گرفت. پس از سرد شدن محتوا لوله ها در دمای اتاق، به هر کدام از لوله ها ۷ میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و جذب نوری هر کدام از مخلوط ها در ۵۴۰ نانومتر محاسبه شد. جذب مخلوط منحنی استاندارد گلوکز بر حسب غلظت گلوکز (میلی گرم بر میلی لیتر) و جذب در ۵۴۰ نانومتر رسم شد (Miller, 1959).

سنجهش فعالیت آلفا آمیلاز

به منظور تأیید خاصیت هیدرولیز کنندگی نشاسته و تعیین میزان تولید آنژیم آلفا آمیلاز، سنجهش فعالیت آنژیم آلفا آمیلاز بر اساس روش برن فلد (Bernfeld, 1955) و با استفاده از معرف دی نیترو سالیسیلیک انجام گرفت. برای این منظور، ابتدا از باکتری انتخاب شده در ۲۰ میلی لیتر محیط نوترینت براث پیش کشته تهیه شد. سپس، میزان ۲ میلی لیتر از پیش کشته باکتری به ۲۰ میلی لیتر محیط

های جداد شده، سویه AT59 براساس قطر هاله ناشی از هیدرولیز نشاسته به مثابه سویه برتر انتخاب و جهت مطالعات آنژیمی استفاده شد.

شناسایی سویه باکتریایی جداد شده

به منظور شناسایی نسبی سویه های جدا شده، تعدادی از آزمون های بیوشیمیایی- میکروبی از جمله رنگ آمیزی گرم، آزمون KOH، آزمون کاتالاز، آزمون هیدرولیز ژلاتین، آزمون هیدرولیز کازئین، آزمون مصرف سیترات و آزمون TSI براساس کتاب Sneath *et al.*, آزمون مصرف سیترات و آزمون TSI براساس کتاب سیستماتیک باکتری شناسی برگی انجام شد (Sneath *et al.*, 1986). شناسایی مولکولی باکتری با تکثیر قسمتی از ژن 16S Forward: 5'-AGTTTGATCC- Reverse: 5'-TGGCTCCAG- Tm=53.7°C با پرایمر -5' Tm = 53.4 °C با GGCTACCTTGTACGACTT- 3' انجام شد (Badoei-Dalfard *et al.*, 2016). واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، در حجم نهایی ۲۵ میکرو لیتر، شامل ۲ میکرو لیتر DNA الگو (10 mM)، ۰/۵ میکرو لیتر از هر پرایمر (۵۰ پیکومول)، ۲ میکرو لیتر (10 mM) dNTP، ۱ میکرو لیتر (50 mM) MgCl₂ ۲/۵ میکرو لیتر بافر (10x)، ۰/۲ میکرو لیتر (5u/ml) Taq DNA Polymerase آنژیم خردباری شده از شرکت سیناژن و ۱۶/۳ میکرو لیتر آب مقطر دیونیزه با برنامه ذیل انجام شد (Badoei-Dalfard *et al.*, 2016): (۱) دمای اوایل ۹۴ درجه سانتی گراد، ۴۵ ثانیه، (۲) ۵۲ درجه سانتی گراد، ۴۵ ثانیه، (۳) ۷۲ درجه سانتی گراد، ۹۰ ثانیه، (۴) برای تکثیر نهایی ۷۲ درجه سانتی گراد، برای مدت ۸ دقیقه. محصول PCR پس از الکتروفورز ژل آگارز یک درصد با استفاده از کیت استخراج DNA خالص سازی شد (Ramezani-Pour *et al.*, 2015; Azadian *et al.*, 2016) توالی DNA سپس، توالی DNA با استفاده از توالی باب DNA شرکت Pioneer، واقع در کره جنوبی تعیین شد. شباهت توالی نوکلئوتیدهای ژن 16S rDN سویه هیدرولیز کننده به کمک نرم افزار BLAST با توالی های ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی ژنوم Gene Bank مقایسه شد. به این ترتیب، نزدیک ترین سویه ها با تراویف 16S rDNA با سویه تعیین شد. همچنین، توالی به دست آمده در این پژوهش در بانک ژنی NCBI ثبت و شماره دستیابی ژنی مربوط (MG192311) دریافت شد. درخت فیلوزنی توالی سویه با توالی حاصل از جست وجو در

در این بررسی، ۱۰ درصد از پیش کشت ۱۸–۲۴ ساعته باکتری موردنظر به محیط‌های حاوی غلاظت ۲ گرم بر لیتر از منابع مختلف نیتروژن شامل پیتون، عصاره مخمر و ژلاتین (منبع نیتروژن آلی) و آمونیوم کلراید، سولفات آمونیوم و سدیم نیترات (منبع نیتروژن غیرآلی) و محیط بدون منبع اضافه شد (Ramachandran et al., 2004). محیط پایه حاوی یک گرم نشاسته، یک گرم پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات، ۰/۰۵ گرم سولفات مینیزیم، ۰/۰۵ گرم کلسیم-کلراید و ۳/۱۳ گرم دی‌سدیم هیدروژن فسفات به‌ازای یک لیتر آب مقطر بود. محیط‌ها ۴۸ ساعت در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. سپس، ۵ میلی‌لیتر از محیط‌ها سانتریفیوژ شدند. پس از ۴۸ ساعت، ۵ میلی‌لیتر از محیط‌ها سانتریفیوژ شد و سنجش فعالیت آنزیمی محلول‌های رویی در طول موج ۵۴۰ نانومتر انجام گرفت. سپس، محلول‌های رویی دور ریخته شدند و وزن رسوبات باکتریایی اندازه‌گیری شد.

تولید آنزیم در حضور ترکیبات یونی مختلف

برای بررسی اثر یون‌های فلزی مختلف بر تولید آنزیم، غلاظت یک گرم بر لیتر از پتاسیم کلراید، سدیم کلراید، کلسیم کلراید و سولفات مینیزیم به محیط کشت بدون یون فلزی اضافه شد (Amoozegar et al., 2013). محیط پایه حاوی یک گرم نشاسته، ۲ گرم تریپتون به‌ازای یک لیتر آب مقطر بود. بعداز ۴۸ ساعت، انکوباسیون در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد، ۵ میلی‌لیتر از هر کدام از محیط‌های حاوی باکتری رشدیافتة سانتریفیوژ شده و مایع رویی به‌منظور سنجش فعالیت آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، وزن تر رسوبات باکتریایی به‌دست آمده اندازه‌گیری شد.

بررسی اثر pH بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز

اثر pH بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز، با تنظیم pH محیط مایع اختصاصی در محدوده ۵–۹ سنجیده شد (Aullybx & Puchooa, 2013). محیط پایه حاوی یک گرم نشاسته، یک گرم پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات، ۲ گرم تریپتون، ۲ گرم سولفات آمونیوم، ۰/۰۵ گرم سولفات مینیزیم، ۰/۰۵ گرم کلسیم کلراید و ۳/۱۳ گرم دی‌سدیم هیدروژن فسفات به‌ازای یک لیتر آب مقطر است. بعد از گذشت ۴۸ ساعت از رشد سویه‌های باکتریایی در این محیط‌ها، ۵ میلی‌لیتر از محیط‌ها سانتریفیوژ شد و فعالیت آنزیمی مایع سنجش شد و وزن تر رسوبات باکتریایی نیز اندازه‌گیری شد.

بررسی فعالیت دمایی آنزیم آلفا-آمیلاز

تولید تلچیح و ۷۲ ساعت در انکوباتور با دمای ۵۰ درجه سانتی-گراد انکوبه شد. ۵ میلی‌لیتر از محیط حاوی باکتری برداشته شد و در ۱۰۰۰ rpm، به‌مدت ۱۰ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شد. محلول رویی قادر باکتری به‌متابه آنزیم مورد استفاده قرار گرفت. سپس، ۵۰۰ میلی‌لیتر از محلول رویی به ۵۰۰ میکرولیتر نشاسته یک‌درصد محلول در بافر سدیم فسفات (pH=۷، ۱۰۰ میلی‌مولار) به عنوان سوبسترا اضافه شد. جهت انجام واکنش، محلول حاصل در ۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۰ دقیقه گرم‌گذاری شد. در مرحله بعد، واکنش آنزیماتیک با اضافه کردن یک میلی‌لیتر از DNS به محلول و قراردادن آن به مدت ۵ دقیقه در آب جوش پایان یافت. این وضعیت به‌متابه وضعیت استاندارد در نظر گرفته شد. با استفاده از منحنی استاندارد گلوکز غلاظت قندهای احیاکننده تولید شده درنتیجه فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز محاسبه شد و به این ترتیب مقدار فعالیت آنزیمی به‌دست آمد. بر این اساس، یک واحد فعالیت آنزیمی مقدار آنزیمی است که در یک دقیقه، یک میکرومول سوبسترا را به یک میکرومول محصول (گلوکز) تبدیل کند.

بررسی تولید آنزیم آلفا-آمیلاز در حضور منابع مختلف

اثر منابع مختلف کربن بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز، برای شناسایی منع کربن مناسب برای تولید آنزیم آلفا-آمیلاز، سویه باکتری جداشده در حضور منابع باکتریایی مختلف کربن شامل گلوکز، گالاكتوز، مالتوز، فروکتوز و نشاسته هر کدام در غلاظت یک گرم بر لیتر به‌مدت ۴۸ ساعت و در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد کشت داده شد (Amoozegar et al., 2013). محیط پایه حاوی یک گرم پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات، ۲ گرم تریپتون، ۲ گرم سولفات آمونیوم، ۰/۰۵ گرم سولفات مینیزیم، ۰/۰۵ گرم کلسیم کلراید و ۳/۱۳ گرم دی‌سدیم هیدروژن فسفات به‌ازای یک لیتر آب مقطر بود. بعد از این مدت، ۵ میلی‌لیتر از این محیط‌ها در ۱۰۰۰ rpm، به‌مدت ۱۰ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شده و محلول‌های رویی به‌منزله آنزیم مورد استفاده قرار گرفت. سنجش فعالیت آنزیمی مطابق با شرایط استاندارد در ۵۴۰ نانومتر صورت گرفت. وزن تر رسوب باکتری‌ها بر حسب میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، به‌منزله معیاری از میزان رشد اندازه‌گیری شد. تمامی آزمایش‌ها سه بار تکرار شد و میانگین گرفته شد.

اثر منابع مختلف نیتروژن بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز

اثر منابع مختلف کربن بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز
 اثر منابع مختلف کربن بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز بعد از ۴۸ ساعت انکوباسیون تحت بررسی قرار گرفت و مشخص شد تولید آنزیم آلفا-آمیلاز AT59 در حضور منابع مختلف کربن شامل نشاسته، مالتوز، فروکتوز و گلوکز افزایش یافته و در حضور نشاسته بیشترین مقدار بوده است، ولی گالاكتوز تأثیر ناچیزی بر میزان تولید آنزیم داشته است. حداکثر رشد این سویه نیز در حضور منع گلوکز به دست آمد. نتایج به دست آمده در شکل ۳ نشان داده شده است.

اثر منابع مختلف نیتروژن بر تولید آنزیم آلفا-آمیلاز
 بررسی تولید آنزیم آلفا-آمیلاز AT59 در حضور منابع مختلف نیتروژن شامل پیتون، عصاره مخمر، ژلاتین، آمونیوم کلراید، سولفات آمونیوم و سدیم نیترات مشخص کرد تولید آنزیم در این سویه در حضور اکثر منابع نیتروژنی افزایش یافته است و ژلاتین تولید آنزیم را تا بیش از سه برابر افزایش داده است. همچنین، سویه مورد نظر حداکثر میزان رشد را در حضور عصاره مخمر نشان داد. نتایج گفته شده در شکل ۴ آمده است.

تولید آنزیم آلفا-آمیلاز در حضور ترکیبات یونی مختلف

اثر یون‌های معدنی مختلف بر تولید آنزیم، با افزودن ترکیبات یونی مختلف شامل پتاسیم کلراید، سولفات منیزیم، سدیم کلراید و کلسیم کلراید هر کدام با غلاظت ۰/۱ درصد، به محیط پایه بدون یون و سپس تلقیح باکتری‌های مورد نظر، بعد از گذشت ۴۸ ساعت انکوباسیون در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد تحت بررسی قرار گرفت. نتایج در شکل ۵ آمده است که نشان می‌دهد تولید آنزیم در حضور یون منیزیم بیشترین مقدار و در حضور یون‌های سدیم و پتاسیم کمترین مقدار بوده است. کمترین میزان رشد این باکتری نیز در محیط حاوی پتاسیم کلراید و بیشترین مقدار در حضور کلراید سدیم مشاهده شد.

بررسی تولید آنزیم آلفا-آمیلاز در حضور pH‌های مختلف
 در این بررسی، تولید آنزیم سویه موردنظر در محیط‌های مایع حاوی نشاسته با pH مختلف در محدوده ۵-۹ تحت بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج شکل ۶ مشخص شد تولید آنزیم با افزایش pH محیط کاهش پیدا کرده و pH=۵ مناسب‌ترین pH برای تولید آنزیم است. همچنین رشد این باکتری نیز به طور کلی با افزایش pH محیط کاهش پیدا کرده و در محیط دارای pH=۵

برای بررسی فعالیت دمایی آنزیم آلفا-آمیلاز، مخلوط ۰/۵ میلی- لیتر سوب باکتریایی حاوی آنزیم و ۰/۵ میلی‌لیتر سوبسترا در محدوده دمایی ۳۰-۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه انکوبه شد. سپس، با اضافه کردن معرف DNS واکنش متوقف شد و پس از قراردادن مخلوط واکنش در دستگاه بن‌ماری به مدت ۵ دقیقه، جذب مخلوط در ۵۴۰ نانومتر خوانش شد. فعالیت باقی‌مانده آنزیم به صورت درصد محاسبه شد (Prakash et al., 2009).

بررسی پایداری دمایی آنزیم آلفا-آمیلاز

برای اندازه‌گیری میزان پایداری دمایی آنزیم، ابتدا ۰/۵ میلی‌لیتر سوب باکتریایی حاوی آنزیم به‌نهایی به مدت یک ساعت در دماهای ۳۰-۹۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد (Karakas et al., 2010). سپس، به نمونه‌ها ۰/۵ میلی‌لیتر سوبسترا اضافه و مخلوط حاصل در شرایط سنجش انکوبه شد. درنهایت، فعالیت باقی‌مانده سوب باکتریایی حاوی آنزیم، با استفاده از معرف دی نیتروسالیسیلیک‌اسید و سپس خوانش جذب مخلوط واکنش در طول موج ۵۴۰ نانومتر اندازه‌گیری شد.

نتایج

غربال‌گری و شناسایی سویه‌های باکتریایی مولد آلفا-آمیلاز
 جهت غربال‌گری باکتری مولد آلفا-آمیلاز گرمادوست، آزمون هیدرولیز نشاسته با استفاده از معرف لوگول روی محیط نشاسته-آگار انجام گرفت و هاله شفاف اطراف کلنی باکتری، که نشان-دهنده تولید آنزیم آلفا-آمیلاز و هیدرولیز نشاسته بود، مشاهده شد (شکل ۱). از ۶۵ سویه باکتریایی جداسده، تعداد ۱۵ مورد توانایی تولید آنزیم آلفا-آمیلاز قابل ملاحظه‌ای را داشتند. به‌منظور شناسایی ابتدایی سویه‌های باکتریایی مولد آلفا-آمیلاز، برخی آزمون‌های بیوشیمیایی انجام گرفت و مشاهده شد سویه‌های باکتریایی جداسده گرم مثبت و دارای فرم باسیل هستند. نتایج مربوط به آزمون‌های بیوشیمیایی در جدول ۱ آمده است. مقایسه توالی ژن 16S rDNA این سویه باکتریایی با گونه‌های نزدیک از نظر توالی ژن موردنظر موجود در NCBI تحت بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تطبیق توالی و درخت فیلوجنتیکی نشان داد که گونه پیش‌گفته به Bacillus licheniformis نزدیک است. توالی نوکلئوتیدی ارائه شده در بانک ژنی NCBI با شماره دسترسی MG192311 ثبت شده است.

جدول ۱- آزمون‌های بیوشیمیایی برای شناسایی سویه‌های باکتریایی.


Table 1. Biochemical tests for identification of the bacterial strains.

باکتری	رنگ آمیزی گرم	محیط اسکیم-میک آثار	هیدرولیز کاژین در محیط کاژین-آگار	هیدرولیز کاژین در لیز زلاتین	هیدرولیز کاتالاز	مصرف سیترات	TSI	قطر هاله حاصل از هیدرولیز نشاسته (سانتی متر)
AT25	پاسیل و گرم مثبت	-	-	-	-	-	-	۰/۳
AT55	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۳
AT56	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۱
AT57	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۲
AT58	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۳
AT59	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۶
AT60	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۱
AT61	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۱
AT62	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۱
AT63	پاسیل و گرم مثبت	-	-	-	-	-	-	۰/۲
AT64	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۲
AT65	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۱
AT66	پاسیل و گرم مثبت	-	-	-	-	-	-	۰/۴
AT67	پاسیل و گرم مثبت	-	-	+	-	-	-	۰/۳
AT68	پاسیل و گرم مثبت	-	-	-	-	-	-	۰/۳




شکل ۱- بررسی تولید آنزیم آلفا-آمیلاز سویه منتخب با استفاده از آزمون هیدرولیز نشاسته. (ایجاد هاله شفاف اطراف ناحیه رشد باکتری نشان دهنده تولید آنزیم آلفا-آمیلاز و هیدرولیز نشاسته است).

Fig. 1. Investigation of alpha-amylase production from the selected strain by using starch hydrolysis test. (Clear zone around bacterium growth indicates alpha-amylase production and starch hydrolyses).




شکل ۲- درخت فیلوجنی سویه باسیلوس لکنی فورمیس AT59. سودوموناس ایروزینا بعنوان گروه خارجی استفاده شد. درخت بر اساس روش neighbor joining تولید شده و مقایسه‌ها بر اساس درصدی از هزار تکرار یاب شده است.

Fig. 2. The phylogenetic tree of *Bacillus licheniformis* AT59. *P. aeruginosa* NBRC 12689 was used as outgroup. The tree was generated using the neighbor-joining method. Bootstrap values expressed as percentages of 1000 replications.




شکل ۳- بررسی تولید آنزیم آلفا-امیلاز در حضور منابع مختلف کربن (آبی) و وزن تر (قرمز) (میلی گرم بر میلی لیتر).

Fig. 3. Investigation of alpha-amylase production in different carbon sources (blue) and wet mass (red) (mg/ml)




شکل ۴- بررسی تولید آنزیم آلفا-امیلاز در حضور منابع مختلف نیتروژن (آبی) و وزن تر (قرمز) (میلی گرم بر میلی لیتر).

Fig. 4. Investigation of alpha-amylase production in various nitrogen sources (blue) and wet mass (red) (mg/ml).



شکل ۵- بررسی تولید آنزیم آلفا-امیلاز در حضور ترکیبات یونی مختلف (آبی) و وزن تر (قرمز) (میلی گرم بر میلی لیتر).

Fig. 5. Investigation of alpha-amylase production in various ion compounds (blue) and wet mass (red) (mg/ml).



شکل ۶- بررسی تولید آنزیم آلفا-امیلاز در حضور pH های مختلف (آبی) و وزن تر (قرمز) (میلی گرم بر میلی لیتر).

Fig. 6. Investigation of alpha-amylase production in various pH (blue) and wet mass (red) (mg/ml).

باکتریایی با خاصیت هیدرولیز کنندگی بالا از چشمۀ آب گرم مشکین شهر جداسازی شد. Asoodeh و همکاران (2013)، سویه‌های باکتریایی مولد آلفا-آمیلاز گرمادوست از چشمۀ آب گرم دیگر رستم با pH=۷/۲ و دمای ۵۵ درجه در جنوب ایران جداسازی کردند. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت چشمۀ‌های آب گرم ایران ذخایر میکروبی بزرگی دارند و می‌توانند به مثابه منابع محصولات بیولوژیکی مختلف مانند آنزیم‌ها استفاده شوند (Fooladi & Sajjadian, 2010). علاوه‌بر این، گزارشی مبنی بر نمونه‌برداری از یک چشمۀ آب گرم واقع در هند جهت دست‌یابی به باکتری‌های مولد آلفا-آمیلاز گرمادوست، به کوشش Sen و همکاران (2014) منتشر شده است. جداسازی باکتری‌های گرمادوست مولد آلفا-آمیلاز از یک چشمۀ آب گرم واقع در ترکیه صورت گرفته است (Baysal et al., 2003). به‌منظور شناسایی ابتدایی باکتری‌های مولد آلفا-آمیلاز گرمادوست جداشده، تعدادی از آزمون‌های بیوشیمیایی از قبیل رنگ‌آمیزی گرم، کاتالاز، هیدرولیز کازئین، هیدرولیز ژلاتین و... انجام و مشخص شد باکتری‌های مورد نظر به شکل باسیل و گرم مثبت هستند. امروزه، تولید تجاری آلفا-آمیلازها با استفاده از اعضای جنس باسیلوس صورت می‌گیرد (Pandey et al., 2001). در مطالعه‌ای، آلفا-آمیلاز مقاوم به گرما از سویه نسبتاً گرمادوست از *Bacillus subtilis* به نام JS-2004 (Mahdavi et al., 2007) آلفا-آمیلازی با فعالیت دمایی وسیع را از سویه‌ای از *Bacillus cereus* به نام GUF8 جداسازی و تعیین خصوصیت کردند. با این حال، علاوه‌بر باسیلوس‌ها، جنس‌های باکتریایی دیگر نیز می‌توانند تولید کنندگان آلفا-آمیلازهای مقاوم به گرما و گرمادوست شناخته شوند، تولید آلفا-آمیلاز نمک-گرمادوست از *Neste*-*Amoozegar* (*renkonia strain F*) (Bozic et al., 2011). گزارش شد. از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر متabolism میکروبی منبع کربن است که می‌تواند بازده تولید آنزیم خارج-سلولی را تحت تأثیر قرار دهد (Bozic et al., 2011). بنابراین، در این پژوهش، به‌منظور دست‌یابی به محیط بهینه، تولید آنزیم آلفا-آمیلاز AT59 در حضور منابع مختلف کربن شامل نشاسته، گلوكز، فروکتوز، مالتوز و گالاكتوز هر کدام با غلظت یک گرم بر لیتر بررسی شد. نتایج نشان داد که نشاسته مؤثرترین منبع در

pH=۹ به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را نشان داده است. **فعالیت و پایداری آنزیم آلفا-آمیلاز در دماهای انکوباسیون مختلف** دما از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ساختار ذاتی یک آنزیم است. از آن‌جا که اکثر فرایندهای صنعتی در دماهای بالا انجام پذیرند، یافتن آنزیم‌هایی که در دماهای بالا قادرند ساختار خود را حفظ کنند و فعال بمانند، اهمیت زیادی دارد. شکل‌های ۷ و ۸ نتایج میزان فعالیت و پایداری آلفا-آمیلاز تولید شده توسط AT59 در دماهای مختلف را نشان می‌دهد. این آنزیم در دماهای مختلف فعالیت و پایداری خوبی نشان داده است. بیشترین فعالیت و پایداری دمایی این آنزیم به ترتیب در دمای ۸۰ و ۷۰ درجه به دست آمد.

بحث

از آن‌جا که اکثر فرایندهای صنعتی معمولاً در دماهای بالا انجام پذیرند، استفاده از آلفا-آمیلازهای گرمادوست، که توانایی فعالیت و حفظ ساختار خود در این دماها را دارند، می‌تواند جهت پیشبرد هرچه بیشتر این فرایندها کمک‌کننده باشد (Bouzas et al., 2006). امروزه، مفیابودن کاربرد آلفا-آمیلازهای گرمادوست در صنایع مختلف از جمله نساجی، فراوری مواد غذایی، مواد شوینده و بهویژه نشاسته جهت انجام هم‌زمان فرایند مایع‌سازی و ژلاتیناسیون نشاسته و کاهش هزینه‌های خنک‌کردن، اثبات شده است (Abdel-Fattah et al., 2012; Antranikian & Egor, 1998). در این پژوهش، به‌منظور جداسازی و غربال گری باکتری‌های مولد آلفا-آمیلاز گرمادوست، چشمۀ آب گرم گروه با دمای تقریبی ۷۰ درجه سانتی گراد واقع در استان کرمان جهت نمونه‌برداری انتخاب شد. جهت غربال گری از محیط نشاسته-آگار استفاده شد و آزمون هیدرولیز نشاسته انجام گرفت. گلندی‌های دارای هالة شفاف به منزله سویه‌های تولید کننده آلفا-آمیلاز گرمادوست شناخته شده‌اند و براساس قطر هاله‌های ایجاد شده سویه AT59، سویه برتر جهت انجام مطالعات آنزیمی در نظر گرفته شد. به طور مشابه، در تحقیق Fooladi و Sajjadian (2010)، به‌منظور دستیابی به سویه‌های مولد آلفا-آمیلاز مقاوم به حرارت، نمونه‌های جمع‌آوری شده از سه چشمۀ آب گرم محلات، لاریجان و مشکین شهر تحت تحلیل قرار گرفت و گلندی

بالاترین سطح تولید آلفا-آمیلاز *Nesterenkonia* sp. F در غلظت ۲ مولار سدیم کلرید مشاهده شد (Amoozegar et al., 2013). در این پژوهش، به منظور تعیین pH بهینه برای تولید آنزیم آلفا-آمیلاز، pH محیط تولید آنزیم در محدوده ۵-۹ تنظیم شد و پس از گذشت ۴۸ ساعت از رشد باکتری در این محیط‌ها، تولید آنزیم تحت بررسی قرار گرفت و مشخص شد تولید بهینه در ۵ pH صورت گرفته است. pH بهینه گزارش شده برای تولید آلفا-آمیلاز در پژوهش‌های قبلی بالاتر از pH بهینه بدست آمده در این پژوهش است (Oziengbe & Onilude, 2012). مطالعه Prakash et al., 2009; Amoozegar et al., 2013؛ فعالیت و پایداری دمایی آلفا-آمیلاز AT59 نشان داد این آنزیم دارای محدوده وسیعی از فعالیت و پایداری در دماهای مختلف بوده و حداقل فعالیت و پایداری این آنزیم در دمای ۸۰ و ۷۰ درجه به دست آمد. Abdel-Fattah و همکاران (2012) فعالیت دمایی آلفا-آمیلاز سویه‌ای از *Bacillus licheniformis* را تحت بررسی قرار دادند و مشخص شد این آنزیم در محدوده دمایی ۸۰-۶۰ درجه سانتی گراد بیشترین فعالیت را داشته است. در مطالعه Kolcuoglu و همکاران (2010)، دمای بهینه برای فعالیت نوعی آمیلاز مالتوزنیک و با مقاومت دمایی بالا، ۵۰ درجه عرفی شده است. Shafiei و همکاران (2012) حداقل فعالیت و پایداری آلفا-آمیلاز *Nesterenkonia* sp. F را به ترتیب در دماهای ۴۵ و ۳۵-۶۰ گزارش دادند. حداقل فعالیت و پایداری آلفا-آمیلاز و نیز به ترتیب در ۸۰ و ۵۰ درجه به دست آمد (Burhan et al., 2003). خالص‌سازی و بررسی ساختاری این آنزیم در دست بررسی است. این نتایج قابلیت فراوان این آنزیم را برای استفاده در صنایع نشان می‌دهد.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلیل حمایت مالی در انجام این پژوهه تشکر و قدردانی می‌کنند.

REFERENCES

- Abdel-Fattah, Y.R., Soliman, N.A., El-Toukhy, N.M., El-Gendi, H. and Ahmed, R.S. 2012. Production, purification, and characterization of thermostable alpha-amylase produced by *Bacillus licheniformis* isolate AI20. – J. Chem. 13: 1-11.

تولید آنزیم بوده است. در پی یافتن محیط بهینه برای تولید آلفا-آمیلاز *Bacillus amyloliquefaciens* ATCC23842 ۰/۵-۲ از منابع مختلف کربن شامل نشاسته محلول، نشاسته هیدرولیز شده، گلوکز، لاکتوز و مالتوز به محیط تولید آنزیم اضافه شد و نتایج نشان داد با اضافه کردن یک درصد نشاسته محلول به محیط کشت، بیشترین بازده تولید آنزیم به دست خواهد آمد (Gangadharan et al., 2006). همچنین، در مطالعه Amoozegar و همکاران (2013)، غلظت یک درصد نشاسته *Nesterenkonia* strain F بهینه برای تولید آلفا-آمیلاز معرفی شد. همچنین، در پژوهش حاضر، محیط تولید آنزیم آلفا-آمیلاز AT59 با اضافه کردن غلظت ۲ گرم بر لیتر از منابع نیتروژن آلی و غیرآلی شامل پیتون، عصاره مخمر، ژلاتین، سدیم نیترات، سولفات آمونیوم و آمونیوم کلراید به محیط پایه فاقد نیتروژن، از نظر منبع نیتروژن مورد استفاده بهینه شد. در این بررسی، تمام منابع تحت مطالعه به جز پیتون بر تولید آنزیم اثر افزایشی داشت و بیشترین بازده تولید در محیط حاوی ژلاتین به دست آمد. این در حالی است که در پژوهش Aiyer (2005) و Oziengbe و Onilude (2012) پیتون بهترین منبع نیتروژن آلی برای تولید آلفا-آمیلاز شناخته شد. بهینه‌سازی محیط تولید آنزیم سویه *Nesterenkonia* strain F در حضور منابع مختلف نیتروژن با غلظت‌های مختلف صورت گرفت و مشخص شد سویه موردنظر در محیط حاوی ۷۵ درصد عصاره مخمر بیشترین میزان آلفا-آمیلاز را تولید کرده است (Amoozegar et al., 2013). در این پژوهش، بررسی اثر یون‌های فلزی مختلف بر میزان تولید آنزیم آلفا-آمیلاز AT59 به وسیله اضافه کردن غلظت ۰/۱ درصد از سولفات‌منیزیم، کلسیم کلرید، پتاسیم کلرید و سدیم کلرید به محیط تولید فاقد یون انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد با وجود افزایش فراوان تولید آنزیم در حضور یون منیزیم (تا ۱/۵ برابر نمونه کنترل)، یون‌های سدیم و پتاسیم تقریباً به طور کامل تولید آنزیم این سویه را مهار کردند. در بررسی پراکاش و همکاران به منظور بهینه‌سازی محیط تولید آنزیم آلفا-آمیلاز، مشخص شد یون کلسیم در غلظت ۵۰ میلی مولار توانسته درصد تولید آنزیم را افزایش دهد (Prakash et al., 2009). در یک مطالعه، سولفات منیزیم در غلظت یک میلی مولار منبع بهینه تولید آنزیم آلفا-آمیلاز معرفی شد (Sodhi et al., 2005).

- Afrisham, S., Badoei-Dalfard, A., Namaki-Shoushtari, A. and Karami, Z.** 2016. Characterization of a thermostable, CaCl_2 -activated and raw-starch hydrolyzing alpha-amylase from *Bacillus licheniformis* AT70: Production under solid state fermentation. – *J. Mol. Catal. B: Enzym.* 132: 98-106.
- Ahmadi, A., Ghobadi, S., Khajeh, K., Nomanpour, B. and Badoei-Dalfard, A.** 2010. Purification of α -Amylase from *Bacillus* sp. GHA1 and its partial characterization. – *J. Iran Chem. Soc.* 7: 432-440.
- Aiyer, P.D.** 2005. Effect of C: N ratio on alpha-amylase production by *Bacillus licheniformis* SPT 27. – *African J. Biotech.* 3: 519-522.
- Amoozegar, M.A., Samareh-Abolhasani, B., Shafiei, M., Didari, M. and Hamedi, J.** 2013. Production of halothermotolerant alpha-amylase from a moderately halophilic bacterium, *Nesterenkonia* Strain F. – *Progress in Biological Sciences.* 2: 85-97.
- Antranikian, G. and Egorova, K.** 2007. Extremophiles, a unique resource of biocatalysts for industrial biotechnology. *Extremophiles.* – ASM Press, Washington 361-406.
- Asgher, M., Asad, M.J., Rahman, S.U. and Legge, R.L.** 2007. A thermostable α -amylase from a moderately thermophilic *Bacillus subtilis* strain for starch processing. – *J. Food Eng.* 79: 950-955.
- Asoodeh, A., Alemi, A., Heydari, A. and Akbari, J.** 2013. Purification and biochemical characterization of an acidophilic amylase from a newly isolated *Bacillus* sp. DR90. – *Extremophiles* 17: 339-348.
- Aullybux, A.A. and Puchooa, D.** 2013. Alpha-amylase production on low-cost substrates by *Naxibacter* sp. isolated from Mauritian soils. – *Br. Microbiol. Res. J.* 3: 478-491.
- Azadian, F., Badoei-Dalfard, A., Namaki-Shoushtari, A. and Hassanshahian, M.** 2016. Purification and biochemical properties of a thermostable, haloalkaline cellulase from *Bacillus licheniformis* AMF-07 and its application for hydrolysis of different cellulosic substrates to bioethanol production. – *Mol. Bio. Res. Comm.* 5: 143-155.
- Babu, K.R. and Satyanarayana, T.** 1995. Alpha-amylase production by thermophilic *Bacillus coagulans* in solid state fermentation. – *Process Biochem.* 30: 305-309.
- Badoei-Dalfard, A., Karami, Z., Ramezani-Pour, N.** 2016. Bench scale production of nicotinic acid using a newly isolated *Stenotrophomonas maltophilia* AC-21 producing highly-inducible and versatile nitrilase. – *J. Mol. Catal. B: Enzym.* 133: 552-559.
- Badoei-Dalfard, A., Karami, Z., Ramezani-pour, N.** 2016. Production and characterization of a nitrilase from *Pseudomonas aeruginosa* RZ44 and its potential for nitrile biotransformation. – *Iranian J. Biotechnol.* 14: 142-153.
- Baysal, Z., Uyar, F. and Aytekin, C.** 2003. Solid state fermentation for production of alpha-amylase by a thermotolerant *Bacillus subtilis* from hot-spring water. – *Process Biochem.* 38: 1665-1668.
- Bernfeld, P.** 1955. Amylases, α and β . – *Methods Enzymol.* 1: 149-158.
- Bouzas, T.M., Barros-Velázquez, J. and Gonzalez Villa, T.** 2006. Industrial applications of hyperthermophilic enzymes: a review. – *Protein Pept. Lett.* 13: 645-651.
- Bozic, N., Ruiz, J., Santin, J., and Vujcic, Z.** 2011. Optimization of the growth and alpha-amylase production of *Bacillus subtilis* IP 5832 in shake flask and laboratory fermenter batch cultures. – *J. Serb. Chem. Soc.* 76: 965-972.
- Burhan, A., Nisa, U., Gökhan, C., Ömer, C., Ashabil, A., and Osman, G.** 2003. Enzymatic properties of a novel thermostable, thermophilic, alkaline and chelator resistant amylase from an alkaliphilic *Bacillus* sp. isolate ANT-6. – *Process Biochem.* 38: 1397-1403.
- Chandra, M.S., Mallaiah, K.V., Sreenivasulu, P. and Choi, Y.L.** 2010. Purification and characterization of highly thermostable alpha-amylase from thermophilic *Alicyclobacillus acidocaldarius*. – *Biotechnol. – Bioprocess Eng.* 15: 435-440.
- Fooladi, J. and Sajjadian, A.** 2010. Screening the thermophilic and hyperthermophilic bacterial population of three Iranian hot-springs to detect the thermostable alpha-amylase producing strain. – *Iran J. Med. Microbiol.* 2: 46-50.
- Gangadharan, D., Sivaramakrishnan, S., Nampoothiri, K.M. and Pandey, A.** 2006. Solid culturing of *Bacillus amyloliquefaciens* for alpha-amylase production. – *Food Technol. Biotechnol.* 44: 269-274.
- Haki, G.D. and Rakshit, S.K.** 2003. Developments in industrially important thermostable enzymes: a review. – *Bioresour. Technol.* 89: 17-34.
- Karakas, B., İnan, M. and Certel, M.** 2010. Expression and characterization of *Bacillus subtilis* PY22 alpha-amylase in *Pichia pastoris*. – *J. Mol. Catal. B: Enzym.* 64: 129-134.
- Kolcuoğlu, Y., Colak, A., Faiz, O. and Belduz, A.O.** 2010. Cloning, expression and characterization of highly thermo-and pH-stable maltogenic amylase from a thermophilic bacterium *Geobacillus caldoxyl-osilyticus* TK4. – *Process Biochem.* 45: 821-828.
- Kristjanson K.J.** 1989. Thermophilic organisms as source of thermostable enzymes. – *Trends Biotechnol.* 7: 49-53.
- Mahdavi, A., Hassan Sajedi, R., Rassa, M. and Jafarian, V.** 2010. Characterization of an alpha-amylase with broad temperature activity from an acid-neutralizing *Bacillus cereus* strain. – *Iran J. Biotechnol.* 8: 103-111.
- Miller, G.L.** 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. – *Anal. Chem.* 31: 426-428.
- Oziengbe, E.O. and Onilude, A.A.** 2012. Production of a thermostable alpha-amylase and its assay using *Bacillus licheniformis* isolated from excavated land sites in Ibadan, Nigeria. – *Bayero Journal of Pure and Applied Sciences* 5: 132-138.
- Pandey, A., Soccol, C.R., Rodriguez-Leon, J.A. and Nigam, P.** 2001. Solid state fermentation in biotechnolog'y. – *J. Microbiol. Methods* 34: 405-423.
- Prakash, B., Vidyasagar, M., Madhukumar, M.S., Muralikrishna, G. and Sreeramulu, K.** 2009. Produ-

- ction, purification, and characterization of two extremely halotolerant, thermostable, and alkali-stable alpha-amylases from *Chromohalobacter* sp. TVSP 101. – Process Biochem. 44: 210-215.
- Ramachandran, S., Patel, A.K., Nampoothiri, K.M., Francis, F., Nagy, V., Szakacs, G. and Pandey, A.** 2004. Coconut oil cake-a potential raw material for the production of alpha-amylase. – Bioresour. Technol. 93: 169-174.
- Ramezani-Pour, N., Badoei-Dalfard, A., Namaki-Shoushtari, A. and Karami, Z.** 2015. Nitrile-metabolizing potential of *Bacillus cereus* strain FA12; Nitrilase production, purification, and characterization. – Biocatal. Biotransform. 33: 156-166
- Samie, N., Noghabi, K.A., Gharegozloo, Z., Zahiri, H.S., Ahmadian, G., Sharafi, H., Behrozi, R. and Vali, H.** 2012. Psychrophilic alpha-amylase from *Aeromonas veronii* NS07 isolated from farm soils. – Process Biochem. 47: 1381-1387.
- Sen, S.K., Raut, S., Satpathy, S., Rout, P.R., Bandyopadhyay, B. and Mohapatra, P.K.D.** 2014. Characterizing novel thermophilic amylase producing bacteria from Taptaapani hot spring, Odisha, India. – Jundishapur. J. Microbiol. 7: 1-7.
- Shafiei, M., Ziaeef, A.A. and Amoozegar, M.A.** 2012. Purification and characterization of a halophilic alpha-amylase with increased activity in the presence of organic solvents from the moderately halophilic *Nesterenkonia* sp. strain F. – Extremophiles 16: 627-635.
- Sneath, P.H.A., Mair, N.S., Sharpe, M.E. and Holt, J.G.** 1986. Bergy's manual of systematic bacteriology, Vol. 2. – William and Wilkins, Baltimore, USA.
- Sodhi, H.K., Sharma, K., Gupta, J.K. and Soni, S.K.** 2005. Production of a thermostable alpha-amylase from *Bacillus* sp. PS-7 by solid state fermentation and its synergistic use in the hydrolysis of malt starch for alcohol production. – Process Biochem. 40: 525-534.
- Souza, P.M.D.** 2010. Application of microbial alpha-amylase in industry-a review. – Braz. J. Microbiol. 41: 850-861.
- Tamura, K., Dudley, J., Nei, M. and Kumar, S.** 2007. MEGA4: Molecular evolutionary genetics analysis (MEGA) software version 4.0. – Mol. Biol. Evol. 24: 1596-1599.
- Zeikus, J.G., Vieille, C. and Savchenko, A.** 1998. Thermozymes: biotechnology and structure-function relationships. – Extremophiles 2: 179-183.

Afrisham, S., Badoei-Dalfard, A., Namaki-Shoushtari, A., Karami, Z. and Malekabadi, S. 2018. Isolation and Identification of *Bacillus* producing thermophilic alpha amylase: production optimization and investigation of the activity and stability of enzyme. – Nova Biologica Rep. 4: 288-298.

افریشم، س.، بدوئی دلفارد، ا.، نمکی شوشتاری، ع.، کرمی، ز. و ملک آبادی، س. ۱۳۹۶. جداسازی و شناسایی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز گرمادوست: بهینه سازی تولید و بررسی فعالیت و پایداری دمایی. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۴: ۲۹۸-۲۸۸.