

تبارزایی مولکولی و آرایه‌شناسی گونه‌های بخشه Cousinia از سرده *Stenocephalae* (تیره کاسنیان) در شمال شرقی ایران

سیمین کلوتی^۱، شاهرخ کاظمپور اوصالو^{۱,۴}، فریده عطار^{۲,۴}، آلفونسو سوزانا^۳ و نوریا گارسیا-جاكاس^۳

^۱گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران؛ ^۲هربایروم مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران؛ ^۳موسسه گیاه‌شناسی بارسلونا، بارسلونا، اسپانیا؛ ^۴قطب تبارزایی موجودات زنده ایران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
*مسئول مکاتبات: شاهرخ کاظم پور اوصالو، skosaloo@modares.ac.ir

چکیده. تبارزایی و تنوع ریختی گونه‌های از سرده *Cousinia* از شعبه *Stenocephalae* (*daryoushiana*) در مناطق شمال شرقی ایران پراکنش دارند، مورد بررسی قرار گرفتند. توالی‌های هسته‌ای ETS و کلروپلاستی (*rpl32-trnL^(UAG)*) برای ۱۲ گونه (۱۷ نمونه) تولید شد. روابط تبارزایی بین گونه‌های با استفاده از روش استنباط بیزی و روش بیشینه درست نمایی بازسازی شد. همچنین نمونه‌ها از لحاظ صفات ریخت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه جدایی این گونه‌ها توسط نتایج حاصل از داده‌های مولکولی (داده‌های ترکیبی هسته‌ای ITS و کلروپلاستی *rpl32-trnL^(UAG)*) بر اساس مطالعه حاضر گونه‌های ذکر شده، بر اساس صفات ریختی و نتایج حاصل از داده‌های مولکولی از یکدیگر جدا می‌شوند. کلید شناسایی و شرح گونه‌ها ارائه می‌شود. این نتایج با مطالعات قبلی ریخت‌شناسی، گردش‌شناسی و تشریحی هموارانی قابل توجهی نداشت.

واژه‌های کلیدی. توزیع جغرافیایی، توالی‌های کلروپلاستی، توالی‌های هسته‌ای، روش استنباط بیزی، صفات ریختی

Molecular phylogeny and taxonomy of species of *Cousinia* section *Stenocephalae* (Asteraceae) in NE of Iran

Simin Kalouti¹, Shahrokh Kazempour Osaloo^{1, 4}, Farideh Attar^{2, 4}, Alfonso Susanna³ & Núria Garcia-Jacas³

¹Department of Plant Biology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran; ²Central Herbarium, School of Biology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran; ³ Botanic Institute of Barcelona (CSIC-ICUB), Pg. del Migdia s.n., 08038 Barcelona, Spain, ⁴Center of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, University of Tehran, Tehran, Iran

Correspondent author: Shahrokh Kazempour Osaloo, skosaloo@modares.ac.ir

Abstract. In this study, the phylogeny and morphological variation of 6 species of the genus *Cousinia* sect. *Stenocephalae*, i.e., *C. hypopolia*, *C. decipiens*, *C. esfandiarii*, *C. renominata*, *C. stahliana* and *C. daryoushiana*, distributed in NE regions of Iran, were investigated. ITS, ETS and *rpl32-trnL^(UAG)* sequences for 12 species (17 specimens) were generated. Phylogenetic interspecies relationships were constructed by Bayesian method and likelihood analysis. The specimens were also investigated in terms of morphological characters. Despite very similar morphological characters and geographical distributions, the separation of these species was confirmed by the obtained results of the molecular data (combined data of plastid and nuclear sequences). On the basis of the present study, the above-mentioned species were almost separated from each other by morphological characters and molecular data. A diagnostic key and the description of these species were also presented. These results did not conform with the previous palynological and anatomical studies of the species.

Keywords. Bayesian analysis, chloroplast sequences, geographical distribution, morphological characters, nuclear sequences

یران، قسمت‌های شرقی و مرکزی رشته کوه البرز، قسمت این، قسمت‌های زاگرس و کوه‌های خراسان شمالی است (Zare et al., 2013). به نظر می‌رسد که ایران خاستگاه و مرکز تنوع این بخش است (Ghaffari & Djavadi, 1998).

صفات متمایزکننده این بخش عبارتند از: برگ‌های علفی یا چرمی کشیده بر ساقه و واحد باللهای بلند، کپه‌ها کوچک، استوانهای باریک، تعداد گل‌ها کم (حداکثر ۳۰ عدد)، برگ‌های گریبان (۱۵-۲۰)، خار انتهایی برگهای برگشته به حالت گسترد، افزایشی با کم‌وبیش برگشته، رنگ جام گل سفید، صورتی، زرد و بهندرت دو رنگ (Saber, 2005; Djavadi & Attar, 2006).

تاكنون مطالعات کروموزومی (Ghaffari et al., 1985; Ghaffari & Djavadi 1998; Ghaffari et al., 2006; Djavadi, 2007; Djavadi & Attar 2010; Djavadi, Saber, 2012; Bordbar et al., 2017) و تشریحی (Saber et al., 2009, 2005)، گرده شناسی (Saber, 2005) بر روی گونه‌های این بخش صورت گرفته است. اما این مطالعات نتوانستند به طور کامل گونه‌های این بخش را تفکیک نمایند. نتایج حاصل از مطالعات کروموزومی عدد کروموزومی $X=13$ را برای گونه‌های این بخش نشان دادند. مطالعه گرده شناسی اگرچه توانست برخی از گونه‌ها را از یکدیگر تفکیک نماید اما جدایی تمامی گونه‌ها با استفاده از نتایج حاصل امکان پذیر نبود. صفات تشریحی به دست آمده در مطالعه ساختار تشریحی برگ‌های میانی ساقه، گونه‌های این بخش را در سه گروه قرارداد. گروه اول: برگ‌ها کاملاً چرمی با دو لایه پارانشیم در هر دو سطح اپیدرم، گروه دوم: برگ‌ها علفی- چرمی دارای یک لایه پارانشیم نربانی در سطح تحتانی اپیدرم. گروه سوم: برگ‌ها علفی با پارانشیم نربانی در سطح فوقانی اپیدرم. محققین دیگر گونه‌های این بخش را به دو گروه تقسیم کرد: (۱) گونه‌های دارای کپه‌های استوانه‌ای و تعداد گل کم (حداکثر ۱۵ عدد)، (۲) گونه‌های دارای کپه‌های تخم مرغی و تعداد گل‌ها و برگ‌های بیشتر از گونه‌های گروه اول. گروه بندی بر اساس صفات گردهای تا حدودی تاییدکننده تقسیم‌بندی بر اساس صفات ریختی می‌باشد (Saber et al., 2009).

تبارزایشی برای تعیین محدوده گونه‌های این بخش صورت نگرفته است. جدیدترین مطالعات مولکولی در ارتباط با این سرده به منظور تعیین مرزهای هسته‌ای (*Cousinia* با استفاده از *nrdNA ITS* و *rpS4-trnT-trnL^(UAA), rpl32-trnL^(UAG)*) صورت گرفته است. این مطالعات شامل تعداد اندکی از گونه‌های بخش

مقدمه

هزارخار (Cousinia Cass.) یکی از سرده‌های مهم ناحیه ایرانو-سورانی است (Rechinger, 1986; Djamali et al., 2012). این سرده یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین سرده‌های تیره کاسنیان Asteraceae Martinov در ایران است (Rechinger, 1972, 1979; Tscherneva et al.; 2005; Rechinger, 2006). با داشتن سه زیر سرده، بعد از سرده *Asteragalus* L. در ایران (Tscherneva et al.; 2005; Djavadi & Attar, 2006) باشند. ۶۰۰ گونه متعلق به طایفه *Cousinia* (Djavadi & Attar, 2006) باشند. زیر طایفه *Carduinae* (Cass.) Dumort. (Cardueae) (Knapp, 1987; Djavadi & Attar, 2010; Zare et al., 2013) باشند. ۴۰۰ گونه از این سرده در آسیای غربی و میانه رویش دارند و ایران دارای تقریباً ۲۴۰ گونه است (Rechinger, 1986; Knapp, 1987; Djavadi & Attar, 2010; Zare et al., 2013). مهم‌ترین مرکز تنوع این سرده سرزمین‌های کوهستانی محدوده پامیر-آلای آسیای میانه با حدود ۱۷۰ گونه است (Knapp, 1987). مناطق شمال شرقی ایران و جنوب ترکمنستان می‌توانند به عنوان دومین مرکز تنوع برای این سرده در نظر گرفته شوند (Zare et al., 2013). بر طبق مطالعه اخیر که بر روی پراکنش این سرده در ایران صورت گرفته است مناطقی در ایران که دارای بالاترین غنای گونه‌ای برای این سرده بودند شناسایی شدند. این مناطق عبارتند از: شمال استان سمنان، کوه‌های دنا، البرز مرکزی، استان لرستان، شمال غربی ایران و کوه‌های کپه داغ (Zare et al., 2013).

در فلورا ایرانیکا برای این سرده ۵۹ بخش در نظر گرفته شده است (Rechinger, 1972, 1979) که از میان آنها ۴۳ بخش برای ایران گزارش شده است (Attar, 2011a). بخش Stenocephalae Bunge بخش‌های *Alpinae* Bunge و *Cynaroidae* Bunge سومین بخش بزرگ سرده در فلورا ایرانیکا است (Ghaffari & Djavadi, 1998). این بخش در دنیا و ایران به ترتیب تقریباً ۴۶ و ۳۵ گونه است و حدود ۳۰ گونه انحصاری در ایران دارد (Attar et al., 2005; Djavadi & Attar, 2006; Attar, 2011b; Saber et al., 2009). گونه‌های این بخش در جنوب غربی آسیا پراکنش دارند (Rechinger, 1972, 1979). گونه‌های این بخش در جنوب غربی آسیا پراکنش دارند (Rechinger, 1972, 1979). گونه‌ها از ترکمنستان تا لبنان بوده و به ترتیب از شرق به غرب از تنوع و تعداد گونه‌ها کاسته می‌شود به طوری که عراق و لبنان هر کدام دارای یک گونه از این بخش هستند (Post,

ارائه شرح گونه‌ها و کلید شناسایی برای گونه‌هایی از این بخش که در شمال‌شرقی ایران پراکنش دارند.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه نمونه‌های هرباریوم‌های دانشگاه تهران (Tehran University of Horticulture and Agriculture) و موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (TARI) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت شناسایی و بررسی نمونه‌ها از فلورا ایرانیکا، ترکیه، شوروی، فلسطین و سوریه استفاده شد. در مجموع ۱۷ نمونه از این ۱۲ گونه (نه گونه دورن گروه و سه گونه برون گروه) مورد بررسی قرار گرفتند. مشخصات نمونه‌ها در جدول شماره ۱ آورده شده است.

استخراج DNA

DNA کل ژنوم از برگ‌های خشک شده نمونه‌های هرباریومی استخراج شد. روش استخراج بر مبنای روش Doyle & CTAB (Doyle, 1987) و با استفاده از کیت استخراج DNA گیاهی (Exgene™ Plant SV mini) انجام شد.

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

هم ر دیف سازی توالی های DNA

بر اساس مطالعات López-Viyallonga et al., 2009, 2011 و گونه‌های *A. lappa*, *A. amplissimum* و *A. umbrosum* به عنوان برون گروه انتخاب شدند. توالی‌های به دست آمده با استفاده از

است (López-Viyallonga et al., 2009). *Stenocephala* 2011). تحلیل‌های تیارازایشی نشان داد که به دلیل سن نسبتاً جوان و تعداد بالای گونه‌های سرده *Cousinia*, تعداد صفات به دست آمده در تحلیل‌ها پایین بوده و علی‌رغم تعداد بالای صفات، امکان نشان دادن جورنمایی وجود دارد (López-Viyallonga et al. 2009).

در بیشتر موارد شناسایی گونه‌های این بخش به مشکل روپرتو است. به دلیل آن که برخی صفات ریخت‌شناسی در گونه‌های این بخش دارای دامنه تغییرات وسیعی بوده و حتی تغییرات ریخت‌شناسی در افراد مختلف یک گونه بالا بوده به طوری که در برخی موارد به عنوان گونه‌های جدید در نظر گرفته می‌شوند. برخی صفات نیز وجود دارند که در حد یک گونه ثابت هستند. برخی گونه‌ها نظیر *C. hypopolia* Bornm. & Sint *C. esfandiarii* Rech.f. & *decipiens* Boiss. & Buhse *C. stahliana* Bornm. *C. renominata* Rech.f. Aellen *C. daryoushiana* Parsa & Gauba به لحاظ برخی صفات ریخت‌شناسی و نیز پراکنش جغرافیایی بسیار شبیه به هم بوده و در قسمت‌های شمال شرقی ایران پراکنش دارند. صفات ریختی گونه‌ها در جمعیت‌های مختلف آنها متغیر است. به طور مثال افراد جمعیت‌های مختلف گونه *C. esfandiarii* به لحاظ صفات ریختی متفاوت بوده و تنوع ریختی در جمعیت‌های آن دیده می‌شود. گونه *C. daryoushiana* در فلور ایران توسط پارسا معروفی شده است و برای این گونه صفات ریختی همچون برگ‌های سبز با پوششی از کرک‌های تار عنکبوتی، برگ‌های ساقه‌ای چرمی بدون دمیرگ مستطیلی، برآکته‌ها با نوک مایل به ارغوانی و منتهی به خاری بلند، کپه‌ها دارای ۷-۱۰ گل، برآکته‌هایی خوابیده بر هم-گسترد، گریبان با کرک‌های تار عنکبوتی را می‌توان در نظر گرفت (Parsa, 1945). در فلور ایرانیکا دو گونه *C. daryoushiana* و *C. decipiens* مترادف در نظر گرفته شده‌اند. مطالعات تشریحی برگ‌های میانی ساقه و گرده‌شناسی تایید کننده نتایج حاصل از مطالعات ریخت‌شناسی گونه‌های مذکور نبودند. تاکنون مطالعه و تبارزایشی مولکولی بر روی گونه‌های ذکر شده در بالا صورت نگرفته است. هدف این

پژوهش: ۱) بررسی روابط تبارزایشی گونه‌های *C. esfandiarii*, *C. decipiens hypopolia* با *C. daryoushiana* و *C. stahliana renominata* استفاده از نشانگرهای هسته‌ای (ETS, ITS) و کلروپلاستی (rpl32-trn L^{UAG}) ۲) تعیین محدوده‌های گونه‌های ذکر شده و ۳) بررسی تنوع ریختی در جمیعت‌های گونه *C. esfandiarii*

جدول ۱- نمونه‌ها، مکان و شماره هرbarیومی آرایه‌های مورد مطالعه.

Table 1. Accessions, locations and herbarium numbers of studied taxa.

Accessions	Voucher Specimen	GenBank accession No: ITS/ETS/rpl32-trnL ^(UAG) /
<i>Cousinia esfandiarii</i> (1) Rech.f. & Aellen	Iran: Semnan: Shahrud, Gardaneh-ye Khosh Yeylagh, 65-68 km to Azadshahr, Saber & Moazzeni 34367 (TUH)	LC530282/LC530299/LC530316
<i>C. esfandiarii</i> (2) Rech.f. & Aellen	Iran: Golestan: Golestan pass, 65 km to Bojnurd: Ghahreman & Attar 21896 (TUH)	LC530283/LC530300/LC530317
<i>C. esfandiarii</i> (3) Rech.f. & Aellen	Iran: Semnan: Shahrud, Tash, Ghahreman, Attar & Mehdigholi 27674 (TUH)	LC530284/LC530301/LC530318
<i>C. esfandiarii</i> (4) Rech.f. & Aellen	Iran: Semnan: Shahmirzad to Fulad-Mahalleh, Ca. 10km after Molla-Deh to Hikoo Village, Attar & Zamani 38719 (TUH)	LC530285/LC530302/LC530319
<i>C. esfandiarii</i> (5) Rech.f. & Aellen	Iran: Semnan: 20 km after Meyqan, Attar, Miratadzadini & Rastegar 45830 (TUH)	LC530286/LC530303/LC530320
<i>C. esfandiarii</i> (6) Rech.f. & Aellen	Iran: Gorgan: Between Azadshahr and Shahrud, after Farsian, Assadi & Azadi 76128 (TARI)	LC530287/LC530304/LC530321
<i>C. decipiens</i> Boiss. & Buhse	Iran: Golestan: Park Golesten, after Tang-e Rah to Bojnurd, Ghahreman, Attar & Mehdigholi 25437 (TUH)	LC530281/LC530298/LC530315
<i>C. renominata</i> Rech.f.	Iran: Khorassan: Kalaleh to Maraveh Tappeh, Gardaneh-ye Chenaran prope: Saber & Moazzeni 34368 (TUH)	LC530288/LC530305/LC530322
<i>C. stahliana</i> Bornm. & Gauba	Iran: Khorassan: 30 km to Bojnurd from Shirvan, Attar & Zamani 43027 (TUH)	LC530289/LC530306/LC530323
<i>C. hypopolia</i> Bornm. & Sint	Iran: Khorassan: Between Bojnurd and Chaman Bid, Ghahreman & Attar 21904 (TUH)	LC530290/LC530307/LC530324
<i>C. daryoushiana</i> Parsa	Iran: Gorgan: On the road from Bojnurd to Shahpasand, Chaman-Bid: Assadi & Maassoumi 21447 (TARI)	LC530291/ LC530308/LC530325
<i>C. stenocephala</i> Boiss.	Iran: Kermanshah: 35 km to Gilane Gharb from Ghasreshirin, Attar & Hamzehee 45544 (TUH)	LC530292/LC530309/LC530326
<i>C. cylindracea</i> var. <i>patula</i> Heimer	Iran: Zanjan: 33 km to Qaidar from Soltanieh, Zarre & Saber 34392 (TUH)	LC530294/LC530311/LC530328
<i>C. alexeenkoana</i> Bornm.	Iran: Hamedan: Soltan Bolagh, between Avaj and Razan, Kharaghan, Djavadi & Ghanbari 20376/3 (IRAN)	LC530293/LC530310/LC530327
<i>A. umbrosum</i> (Bunge) Kuntze	Iran: Khorassan: road of Neyshabour, Binaloud, Ghahreman & Attar 21914 (TUH)	LC530280/LC530297/LC530314
<i>A. amplissimum</i> (Boiss.) Kuntze	Iran: Khorassan: Hezar Masjed, Arab Chah, Attar& Zaman 43023 (TUH)	LC530279/LC530296/LC530313
<i>Arctium lappa</i> L.	Iran: Mazandaran: Karaj-Chalus road. Pol-e Zanganeh, near the river, Nazarian 33071 (TUH)	LC530278/LC530295 /LC530312

مجدد شاخه‌ها استفاده شد. روش استنباط بیزی به صورت بر خط از طریق نسخه ۳. ۳ گذرگاه علمی Miler et CIPRES (2010) و روش بیشینه درستنمایی از طریق نسخه اینترنتی Trifinopoulos et al 2016: W-IQ (IQ TREE) مورد تحلیل قرار گرفتند. پیش فرض روش استنباط بیزی برای آنالیزهای فیلوزنی ۴ زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) شامل ۳ زنجیره گرم و ۱ زنجیره سرد است که برای ۱۰۰ میلیون نسل اجرا شد و هر ۱۰۰۰ نسل، یک درخت نمونه شانگرهای هسته‌ای ITS و کلروپلاستی- rpl32 با استفاده از نرمافزار MUSCLE (Edgar, 2004) و به صورت چشمی در نرمافزار PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2002) هم‌ردیف سازی شدند. تحلیل و بررسی‌های تبارزایشی به منظور آنالیز داده‌ها از نرم افزار PAUP* (Swofford, 2002) از روش جستجوی ابتکاری تعییه شده در نرمافزار با ۱۰۰۰ تکرار و روش تبادل شاخه، دو نیمه‌سازی درخت و اتصال

C. esfandiarii (76128: TARI) در این زیر کlad نمونه‌های (45830: TUH) به همراه گونه‌های (*C. alexeenkoana*) (همدان) و (*C. cylindracea* var. *patula*) (زنجان) قرار گرفته‌اند. دو نمونه (*C. esfandiarii*) (45830: TUH) با احتمال پسین بیزی بالا (*C. esfandiarii*) (76128: TARI) از یکدیگر جدا شده‌اند. نمونه‌های (*PP=1.00*) از پسین بیزی بالا (38719: TUH) (21896: TUH) (34367: TUH) (27674: TUH) (نshedه به همراه گونه‌های (*C. esfandiari*) (76128: TARI) (*C. alexeenkoana*), (همدان) و (*C. cylindracea* var. *patula*) (زنجان) قرار می‌گیرند. (*PP=1.00*) از پسین بیزی بالا (38719: TUH) (27674: TUH) با احتمال پسین بیزی و درصد بوتستراپ بیشینه درست‌نمایی بالا از یکدیگر جدا شده‌اند (*PP=1.00*, *BP=100*). در کlad دوم دو گونه (*C. daryoushiana* و *C. renominata*) متعلق به یک پلی‌تومی بهوده و از دیگر گونه‌های قرار گرفته در کlad دوم جدا شده‌اند (*C. decipiens* (*PP=1 BP=78*) با احتمال پسین بیزی (*PP=0.79*) خویشاوند است. (*C. stahliana* و *C. decipiens*) با احتمال پسین بیزی (*PP=1.00*) گونه‌های خواهری هستند.

برداری شد. پس از پایان اجرای برنامه، انحراف معیار برای توالی‌های هسته‌ای و کلروپلاستی به ترتیب ۰/۰۰۶ و ۰/۰۰۴ بود و هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد بدین معناست که هر دو اجرا درخت‌های احتمالی را که بسیار مشابه هم بودند، نمونه‌برداری کردند و توزیع درختان نمونه‌گیری شده به توزیع هدف، همگرایی یافت. سپس ۲۵ درصد درختان یعنی درختانی که به مرحله همگرایی نرسیده بودند و احتمال پسین خوبی نداشتند حذف شدند. مدل تکاملی برای داده‌های هسته‌ای ITS و ETS و کلروپلاستی *rpl32-trnL^(UAG)* با استفاده از برنامه MrModeltest version 2.3 (Nylander, 2004) GTR+I Akaike معیار اطلاعاتی (AIC) انتخاب شد. مدل ETS و ITS برای داده‌های حاصل از نشانگرهای هسته‌ای *rpl32*-*trnL^(UAG)* برای داده‌های حاصل از نشانگر کلروپلاستی در نظر گرفته شدند. جایگاه‌های حذف و اضافه برای همه داده‌ها نیز به عنوان صفات دو حالت در نظر گرفته شدند و با استفاده از نرم‌افزار Fastgap V.1.2 (Borchsenius, 2009) کد داده شدند. درخت‌های تکاملی حاصل از داده‌های هسته‌ای و کلروپلاستی بصورت مجزا فاقد صفات اطلاعاتی بودند و در این مطالعه برای تحلیل تبارزایی این گروه از گونه‌ها از درخت حاصل از داده‌های ترکیبی هسته‌ای و کلروپلاستی استفاده شد. مشخصات داده‌های مولکولی در جدول شماره ۲ آرائه شده است.

کلید شناسایی گونه‌های مورد مطالعه

- ۱- جام گل زرد رنگ، برگ‌های فوقانی احاطه کننده کپه‌ها فاقد بریدگی یا دارای بریدگی‌های کم عمق ۲
- جام گل ارغوانی یا زرد، برگ‌های فوقانی احاطه کننده کپه‌ها دارای بریدگی (تا عمیق). ۵
- ۲- کپه‌ها کوچک و کشیده، برگ‌های فوقانی احاطه کننده کپه‌ها ۳
- کپه‌ها تخم مرغی کوچک، برگ‌های فوقانی تا حدودی احاطه کننده کپه‌ها *C. stahliana*
- ۳- برآکته‌های گریبانی با خار انتهایی بلند و افراشته ۴
- برآکته‌های گریبانی با خار انتهایی کوتاه و افراشته *C. renominata*
- ۴- کپه‌ها به طور متراکمی کرکدار، برگ‌های فوقانی احاطه کننده *C. decipiens* ۵
- کپه‌ها سطح رویی برگ‌ها سبز رنگ *C. hypopolia*
- ۵- برآکته‌های گریبان افراشته با خار کوتاه، برگ‌های فوقانی احاطه کننده کپه‌ها دارای بریدگی‌های کم عمق *C. daryoushiana*
- برآکته‌های گریبان افراشته تا برگشته با خار کوتاه تا بلند، برگ‌های فوقانی احاطه کننده کپه‌ها دارای بریدگی‌های عمیق *C. esfandiarii*


نتایج

جهت ترکیب داده‌ها، ناسازگاری مهمی بین سه گروه داده‌های هسته‌ای و کلروپلاستی بر پایه آزمون اختلاف طول ناسازگار (Faris et al. 1995) تعییه شده در نرم‌افزار PAUP* (Swofford, 2002) مشاهده نشد (*P=0.05*) در نتیجه ماتریس ترکیبی از داده‌های هسته‌ای و کلروپلاستی تهیه شد. در درخت تبارزایی حاصل از داده‌های ترکیبی هسته‌ای ITS, ETS و کلروپلاستی *rpl32-trnL^(UAG)* دو کlad با احتمال پسین بیزی بالا (*PP=0.95*) از یکدیگر جدا شده‌اند. گونه (*C. stenocephalae*) با احتمال پسین بیزی بالا (*PP=1.00*) از این کladها جدا شده است. کlad اول افراد گونه *C. esfandiarii* به همراه گونه‌های *C. cylindracea* var. *patula* (همدان) و *C. alexeenkoana* (زنجان) و کlad دوم گونه‌های *C. hypopolia*, *C. daryoushiana*, *C. decipiens*, *C. renominata*, *C. stahliana* را شامل می‌شوند. کlad اول با احتمال پسین بیزی بالا (*PP=0.99*) شامل یک زیر کlad با احتمال پسین بیزی و درصد بوتستراپ بیشینه درست‌نمایی بالا است (*PP=1.00*, *BP=82*).

جدول ۲- مشخصات داده‌های مولکولی مورد تحلیل و بررسی

Table 2. Summary statistics of the molecular data sets analysis.

	nrDNA ITS	nrDNA ETS	cpDNA <i>rpl32-trnL</i> ^(UAG)	Combined ETS-ITS- <i>rpl32-trnL</i> (UAG)
Number of samples	17	17	17	17
Number of characters	645	1026	978	2649
GC contents mean (%)	30.35	25.4	13.65	21.95
Parsimony-Informative Characters, included /not included outgroups (PIC)	59/19	55/18	21/7	135/44
Conserved Characters included /not included outgroups(McCauley)	558/595	753/781	948/964	2259/2340
Variable Characters included /not included outgroups (VC)	85/46	93/58	29/12	207/116
CI of MPTs (excluding uninformative characters)	0.887	0.800	1.000	0.838
RI of MPTs (excluding uninformative characters)	0.921	0.868	1.000	0.889
Overall Mean p-distance	0.028	0.026	0.008	0.018
Best fitting model of evolution (BI analyze)	GTR+I	GTR+ I	GTR	GTR +I
Best fitting model of evolution (ML analyze)	-	-	-	TIM2+F+I



شکل ۱- درخت حاصل از بازسازی روابط تبارزایشی داده‌های ترکیبی هسته‌ای و کلروپلاستی (ITS + ETS + *rpl32-trnL*^(UAG)) بر اساس روش استنباط بیزی. مقدار احتمال پسین بیزی و درصد بوتستراپ بیشینه در بالای هر یک از شاخه‌ها نمایان است.

Figure 1. 50% rule consensus tree resulting from Bayesian analysis of the combined dataset (ETS+ITS+*rpl32-trnL*^(UAG)). Numbers above branches are posterior probability (PP) and bootstrap values from maximum likelihood, respectively.

۷۰-۳۷، چرمی، در بخش‌های قاعده‌ای همپوش، نوک خار براكته‌ها کمی تا کاملاً برگشته به خارج یا افراسته، براكته‌های داخلی دارای زگیل‌های پراکنده، گل‌ها به تعداد (۱۴-۱۸)-۲۷، جام ارغوانی یا زرد ارغوانی رنگ، به طول ۱۳-۱۵ میلی‌متر، پهنک جام به طول ۸-۹ میلی‌متر، لوله جام ۴-۶ میلی‌متر، لوبه‌ها ۲-۳ میلی‌متر، لوله بساک ارغوانی، فقد کرک، فندقه دیده نشد. جقه‌ها زود افت.

تیپ: خراسان: کوه‌های خوش ییلاق: ۷۰ کیلوتری شرق شهرهود، ۲۰۰-۲۲۰۰ متر.

پراکنش عمومی: احصاری ایران.
نمونه‌های دیده شده: گلستان: پارک ملی گلستان، ۶۵ کیلومتر به جنورد، ۲۱۵۰ m، قهرمان، عطار TUH-۲۱۸۹۶؛ شاهرود: خوش ییلاق، ۲۱۰۰-۱۹۹۰ m، صابر و موذنی TUH-۳۴۳۶۷؛ گلستان: گرگان: بین آزادشهر و شاهرود، بعد از فارسیان، اسدی و آزادی TARI-۷۶۱۲۸؛ سمنان: شهمیرزاد به فولاد محله، تقریباً ۱۰ کیلومتر بعد از مladde به روستای هیکو، عطار و زمانی TUH-۳۸۷۱۹؛ سمنان: ۲۰ کیلومتر بعد از میجان، عطار، میرتاج الدینی و رستگار، TUH-۴۵۸۳۰-۲۷۶۷۴.

C.renominata Rech. f., Fl. Iranica. Vol.90, pp. 163. (1972, 1979). Syn.: *C. Turkmenorum* Bornm. & Gauba, Feddes Repert. 46: 277 (1939).

شکل‌های ۲G و ۴C

گیاهی چند ساله، در قاعده چوبی، به ارتفاع ۱۵-۲۰ سانتی-متر، ساقه پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی خوابیده و سفید. برگ‌ها علفی- چرمی، دو رنگ، سطح زیرین به-طور متراکم پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی خوابیده و سفید برفی؛ فوقانی ترین برگ‌ها در قاعده گرد- گوهای و فقد بریدگی‌های عمیق، تقریباً احاطه کننده کپه‌ها. کپه‌ها منفرد یا ۲ تایی، تخم مرغی کشیده و باریک یا استوانه‌ای، در قاعده ۱-۲ گرد، در بالا اندکی فشرده، دارای دم گل آذین کوتاه به طول ۱-۲ میلی‌متر؛ گریبان به ابعاد ۱۴×۵-۷ میلی‌متر، پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی نسبتاً ریزان. براكته‌ها به تعداد ±۳۰، هم پوش، افراسته، گل‌ها به تعداد (۱۲)-۷-۶، جام زرد رنگ، به طول ۱۱-۹ میلی‌متر، پهنک جام به طول ۷ ± میلی‌متر، لوله جام ۳/۵-۲/۵ میلی‌متر، لوله بساک ارغوانی، فقد کرک، فندقه دیده نشد.

تیپ: خراسان: گردنه چناران، اطراف مروان تپه، ۷۰۰ متر.

پراکنش عمومی: احصاری ایران.

نمونه‌های دیده شده: کلاله به مراوه تپه، گردنه چناران، چنارانی، ۳۴۳۶۸-TUH-۶۰۸ m.

شرح گونه‌ها

Cousinia decipiens Boiss. & Buhse, Nouv. Mem.

Soc. Nat. Mose. 12 (18): 125 (1860). Syn.: *C.*

hyrcanica Bornm., Osterr. Bot. Zeitschr. 75: 233

(1926), syn. nov. edescr. *C. Daryoushiana* Parsa,

Kew Bull. 1948: 203 (1948).

شکل‌های ۲F و ۴A

گیاهی چند ساله، در قاعده چوبی. ساقه به ارتفاع ۳۰-۵۰ سانتی-متر. پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی متراکم و خوابیده، کرک‌ها کم‌وپیش ریزان. برگ‌ها چرمی- علفی، به رنگ سبز تیره، در هر دو سطح پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی خاکستری؛ فوقانی ترین برگ‌ها فقد بریدگی‌های عمیق، تخم مرغی شکل، احاطه کننده کپه‌ها. کپه‌ها به صورت منفرد یا ۲-۳ تایی، تخم مرغی پهن تا باریک یا استوانه‌ای کوچک، گریبان به ابعاد ۱۸-۷ (۱۲-۷) میلی‌متر، پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی ۱۵-۱۳×۱۵-۱۳ میلی‌متر، پوشیده از کرک‌های عمیق، در قاعده هم- متراکم. براكته‌ها به تعداد ۶۰-۳۰، چرمی ضخیم، در قاعده هم- پوش، در میانه‌های طول فشرده شده، در انتهایهای طول فشرده شده از کرک‌های ریز؛ گل‌ها به تعداد (۱۸)-۱۳-۹، جام ارغوانی یا زرد، در حالت خشک شده رنگ پریده، طول جام ۱۰-۱۴ میلی‌متر، پهنک جام ۶/۷-۵/۵ میلی‌متر، لوله جام ۵ میلی‌متر، لوبه‌ها ±۲/۵ میلی‌متر، لوله بساک ارغوانی، در حالت خشک شده رنگ پریده. فندقه‌ها به طول ۳ میلی‌متر، قهوه‌ای تیره، در قسمت فوقانی دندانه‌دار.

تیپ: کوه‌های شاه کوه.

پراکنش عمومی: احصاری ایران.

نمونه دیده شده: گلستان: پارک ملی گلستان، بعد از تنگه راه به طرف بجنورد، ۱۲۰۰ متر، قهرمان، عطار و مهدیقلی، TUH-۲۵۴۳۷.

C. esfandiarii Rech. f. & Aell., Ann. Nat. Mus.

Wien 57: 75 (1950).

شکل‌های ۲ (A, B, C, D, E) و ۳ (A, B, C, D, E)

گیاهی چند ساله، به ارتفاع تقریبی ۲۰-۴۵ سانتی‌متر، در قاعده چوبی. برگ‌ها چرمی- علفی، تقریباً دو رنگ، گاهی یکرنگ، در هر دو سطح به‌طور بسیار متراکم پوشیده از کرک‌های عنکبوتی و نمدی خوابیده و خاکستری، گاهی کرک‌دار غدهای و منقوط، گاهی بدون کرک شونده، فوقانی ترین برگ‌ها به تدریج کوچک شونده، تخم مرغی پهن، در قاعده گرد- گوه ای دارای بریدگی‌های عمیق؛ نزدیک به کپه‌ها. کپه‌ها منفرد یا ۲-۳ تایی، تخم مرغی شکل، در قسمت بالا فشرده؛ گریبان به ابعاد ۱۵-۱۲-۷-۱۰ میلی‌متر، پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی بسیار متراکم، گاهی تنک و غدهای براكته‌ها به تعداد

C. stahliana Bobnm. & Gauba, Mitt. Thur. Bot. Ver. N. F. 47: 117 (1941). Syn.: *G. hypopoliasensu* Kult., Herb. Fl. As. Med. nur. 45 et auct., nec Bornm. & Sint. (1907).

شکل‌های ۴D و ۴H

گیاهی چند ساله، در قاعده چوبی، به ارتفاع ۳۰-۱۵ سانتی‌متر، ساقه پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی خاکستری. برگ‌ها چرمی‌ضخیم، بیضوی-تخم مرغی، تقریباً دو رنگ، در هر دو سطح پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی متراکم و تقریباً خاکستری؛ فوقانی ترین برگ‌ها فاقد بریدگی‌های عمیق، تقریباً با فاصله از کپه واقع شده. کپه‌ها تخم مرغی شکل، منفرد یا ۲-۳ تایی؛ گریبان با احتساب خارها به قطر ۱۰-۱۴ میلی‌متر، واجد کرک‌های بسیار تنک، برآکته‌ها به تعداد (۹۰-۸۰)، در قاعده کاملاً هم‌پوش و افراشته؛ برآکته‌های خارجی و میانی واجد خار انتهایی ظریف و نسبتاً بلند به حالت برگشته؛ برآکته‌های میانی درفشی-سر نیزه‌ای، حاشیه برآکته‌ها از قاعده تا رأس مژه‌دار؛ داخلی ترین برآکته‌ها غشایی و خارج شده از گریبان. گل‌ها به تعداد ۱۳-۲۰، جام زرد لیمویی به طول ۹-۱۳ میلی‌متر، لوله جام ۲-۴/۵ میلی‌متر، پهنک جام ۶-۸ میلی‌متر، لوبه‌ها ۲±۵ میلی‌متر. فندقه‌ها واژه‌مرمی به ابعاد ۲/۵×۱ میلی‌متر، تقریباً پهن و فشرده، قهوه‌ای رنگ پریده، در قسمت‌های فوقانی گرد.

C. daryushiana Parsa, Flore de l'Iran, vol. 3: 480 (1943).

شکل ۴E

برگ‌ها سبز با پوششی از کرک‌های تار عنکبوتی، برگ‌های ساقه‌ای چرمی بدون دمبرگ مستطیلی، نوک تیز، به عرض ۳-۴ سانتی‌متر،

C. hypopolia Bornm. & Sint, Bull. Herb. Boissier, Ser. 2, 7: 214 (1907).


شکل‌های I و ۴B

گیاهی چند ساله، در قاعده چوبی؛ به ارتفاع ۴۰-۲۰ سانتی‌متر. ساقه پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی خواهد. برگ‌ها چرمی، تقریباً دو رنگ، در حاشیه واجد دندانه‌های دور از هم، پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی و نمدی متراکم و خاکستری؛ فوقانی ترین برگ‌ها فاقد بریدگی‌های خیلی عمیق، تا حدودی یا کاملاً احاطه کننده کپه‌ها. کپه‌ها منفرد یا ۲-۳ تایی، تخم مرغی-استوانه‌ای پهن و دراز، در قاعده گرد؛ گریبان با احتساب خارها به ابعاد ۱۳-۱۴×۱۳-۱۴ میلی‌متر، پوشیده از کرک‌های تار عنکبوتی نسبتاً تنک و ریزان، برآکته‌ها به تعداد ۴۹-۶۰، چرمی، در قاعده هم‌پوش، منتهی به خار بلند انتهایی به طول ۳-۱ میلی‌متر، نوک برآکته‌های خارجی و میانی به حالت برگشته-گستردگی به ندرت افراشته؛ گل‌ها به تعداد ۱۰-۱۵، جام زرد به ندرت ارغوانی رنگ، به طول ۱۲/۵ میلی‌متر، پهنک جام به طول ۸-۷ میلی‌متر، لوله جام ۴-۵ میلی‌متر، لوبه‌ها ±۲ میلی‌متر، لوله بساک ارغوانی، فاقد کرک. فندقه دیده نشد.

تیپ: خراسان: بجنورد، سولوکلو، در کوه‌های شیستی.

پراکنش عمومی: انصاری ایران.


نمونه دیده شده: خراسان: بین بجنورد و چمن بید، ۲۰۰۰ متر، قهرمان و عطار TUH-۲۱۹۰۴.



شکل ۲- تصاویر برآکته‌های (خارجی، داخلی، میانی) به ترتیب راست به چپ) گونه‌های مورد مطالعه. A-E. گونه‌های مورد مطالعه. E-D, C, B, A. گونه‌های ۱-۵ از گونه *C. hypoplia*.

.C. *hypoplia* گونه I. *C. stahliana*. G. *C. renominata*. F. *C. decipiens*. G. *C. renominata*. H. *C. stahliana*. I. *C. hypoplia*.

Figure 2. Photos of the bracts (outer, median, and inner from right to left, respectively) of the studied species. A, B, C, D, E, 1-5 individuals from *C. esfandiarii*. F. *C. decipiens*. G. *C. renominata*. H. *C. stahliana*. I. *C. hypoplia*.



شکل ۳- تصاویر افراد ۱-۶ از گونه *C. esfandiarii*
Figure 3. Photos of 1-6 individuals from *C. esfandiarii*.



شکل ۴- تصاویر گونه‌های A .*C. decipiens* B .*C. hypopolia* C .*C. renominata* D .*C. stahliana* E .*C. daryoushiana*
Figure 4. Photos of the species: A: *C. decipiens*, B: *C. hypopolia*, C: *C. renominata*, D: *C. stahliana*, E: *C. daryoushiana*

C. cylindracea var. *C. alexeenkoana* و *C. cylindracea* var. *patula* دارای پراکنش در غرب ایران بوده و سپس به مناطق شرقی پراکنده شده‌اند و یا بالعکس. ۲) گونه *C. esfandiarii* در گذشته دارای پراکنده‌گی وسیعی بوده و هم اکنون به مناطق شرقی و شمال شرقی ایران محدود شده است. هر یک از این احتمالات مستلزم بررسی بیشتر است.

دو گونه *C. daryoushiana* و *C. decipiens* (Rechinger 1972, 1979) مترادف ذکر شده‌اند، با استفاده از نتایج حاصل از داده‌های مولکولی (شکل ۱) از یکدیگر جدا قرار گرفته‌اند. این دو گونه از نظر صفات ریخت-شناسی نظیر رنگ جام گل، بریدگی‌های برگ‌های فوچانی، طول خار کپه‌ها، شکل کپه‌ها و کرکپوش کپه‌ها از یکدیگر متمایز می‌شوند. بر اساس داده‌های مولکولی و صفات ریختی پیشنهاد می‌شود که این دو گونه مترادف نبوده و دو گونه *C. Saber* هستند. در مطالعه (2005) دو گونه *C. hypopolia* و *C. stahliana* در یک کمپلکس گونه‌ای قرار گرفته‌اند، وجود این کمپلکس با داده‌های مولکولی تأیید نشد و این گونه‌ها با حمایت نسبتاً بالای آماری از یکدیگر جدا شده‌اند.

تنوع ریختی مشاهده شده در افراد جمعیت‌های مختلف *C. esfandiarii* توسط داده‌های مولکولی تأیید می‌شود. این گروه‌بندی با صفات ریخت‌شناسی همچون تعداد گل، رنگ جام گل، شکل کپه‌ها، کرکپوش برگ‌ها و شکل خار انتهایی برآکته‌ها حمایت می‌شود. پیشنهاد می‌شود که این افراد در یک گروه و تحت نام *C. esfandiarii* قرار بگیرند و نمی‌توان آنها را به گونه‌های مجزا تفکیک نمود، چرا که این امر مستلزم مطالعات بیشتر بر روی افراد جمعیت‌های مختلف این گونه است.

نتایج حاصل از داده‌های مولکولی در مطالعه حاضر تأیید-کننده نتایج حاصل از مطالعات گردeshناسی و تشریح برگ‌های میانی ساقه (Saber et al., 2009) (Saber et al., 2009) نبودند. در مطالعه با استفاده از داده‌های ترکیبی هسته‌ای و کلروپلاستی (ITS, rpS4-trnT-trnL) ۸/۷ میلیون سال قبل تخمین زده شد که نشان‌دهنده جوان بودن این سرده است. در این مطالعه سن تقریبی برخی از گونه‌های بخش Stenocephalae نیز برآورد شده است. سن گونه‌های این بخش کمتر از ۴/۴ میلیون سال قبل بیان شد که نشان‌دهنده جوان بودن این بخش است. همچنین پژوهشگران جوان بودن سرده، کمبود صفات اطلاعاتی و امکان وجود جورنمایی را از دلایل احتمالی برای روابط حل نشده

در حاشیه دارای بخش‌های مستطیلی، در طول کوتاهی کشیده بر ساقه، برآکته‌ها با نوک مایل به ارغوانی و منتهی به خاری بلند، کپه‌ها دارای ۷-۱۰ گل، دارای دم گل کوتاه به قطر ۱۵-۱۷ میلی‌متر با برآکته‌های خوابیده بر هم-گسترد، گریبان با کرک‌های تار عنکبوتی، برآکته‌ها نیزه‌ای بلند در سطح خارجی بدون کرک شونده، تار نهنجی سفید، نهنج با کرک‌های سفید، فندقه ۳ وجهی در بالا با حاشیه‌ای از دندانه‌های نامساوی.

تیپ: شرق ایران: مناطق استپی جنگل ابر، ۱۵۰۰ متر.

پراکنش عمومی: ایران

نمونه دیده شده: گرگان: در جاده بجنورد به شاه پسند، چمن پیدی، اسدی و معصومی TARI ۲۱۴۴۷.

بحث

مطالعه بر روی گونه‌های بخش Stenocephalae نشان داد، گونه‌هایی از این بخش که در شمال شرقی ایران پراکنش دارند، از نظر صفات ریخت‌شناسی بسیار شبیه به هم بوده و پیدا کردن صفات ریخت‌شناسی که متمایز کننده این گونه‌ها از یکدیگر است بسیار مشکل است (Saber, 2005); زیرا در جمعیت‌های مختلف هر یک از این گونه‌ها صفات ریختی متغیر بوده و تنوع ریختی در جمعیت‌های مختلف گونه‌ها قابل مشاهده است. از این رو جدایی گونه‌ها تنها با استفاده از صفات ریخت‌شناسی مشکل است. همان‌طور که درخت تبارزایشی (شکل ۱) نشان می‌دهد، گونه‌های مذکور با حمایت بالای آماری از یکدیگر جدا شده‌اند. روابط دو گونه *C. daryoushiana* و *renominata* با یکدیگر و با سایر گونه‌های بررسی شده در این مطالعه حل نشده باقی مانده است. افراد جمعیت‌های مختلف گونه *C. esfandiarii* با حمایت بالای آماری از سایر گونه‌های شمال شرقی بخش Stenocephalae جدا شده‌اند که مطالعه حاضر با نتایج حاصل از مطالعه‌ای که کمپلکس گونه‌ای *C. decipiens* و *C. esfandiarii* را به دلیل عدم یافتن صفات ریخت‌شناسی مهم جهت جدایی این دو گونه مطرح می‌کند (Saber, 2005) در تضاد است. نمونه‌های *C. esfandiarii* (76128: TARI) *C. cylindracea* var. (45830: TUH) به همراه گونه‌های *C. cylindracea* var. *patula* (زنجان) و (همدان) قرار گرفته‌اند. این دو گونه دارای پراکنش وسیعی در ایران بوده و در مناطق غربی و شرقی کشور پراکنده‌گی دارند. با توجه به اینکه به همراه دو نمونه از گونه *C. esfandiarii* قرار گرفته‌اند چند احتمال را می‌توان در نظر گرفت: (۱)

REREFENCES

- Attar, F., Ghahreman, A., Saber, A. & Zarre, S. 2005. A new species of the genus *Cousinia* (Compositae, sect. *Stenocephalae*) from SW of Iran. Iranian Journal of Botany 11: 65-69.
- Attar, F. 2011a. Taxonomic revision of *Cousinia* sect. *Albidae* Bunge (Asteraceae) in the flora of Iran. Iranian Journal of Botany 17: 150-157.
- Attar, F. 2011b. New taxa of *Cousinia* Cass., Sect. *Stenocephalae* Bunge (Asteraceae) from Iran. Taxonomy and Biosystematics 3: 59-68.
- Baldwin, B.G & Marcos, S. 1998. Phylogenetic utility of the external transcribed spacer (ETS) of 18S-26S rDNA: Congruence of ETS and ITS trees of *Calycadenia* (Compositae). Molecular Phylogenetics and Evolution 10: 449-463.
- Borchsenius, F. 2009. FastGap 1.2. Department of biosciences, Aarhus University, Denmark. Published online at http://www.aubot.dk/FastGap_home.htm
- Bordbar, F., Baqeri, M. & Mirtadzadini, M. 2017. New chromosome counts in *Cousinia* (Asteraceae) from Flora of Iran. Cytologia 82: 485-488.
- Djamali, M., Baumel, A., Brewer, S., Jackson, S.T., Kadereit, J.W., López-Vinyallonga, S., Mehregan, I., Shabani, E. & Simakova, A. 2012. Ecological implications of *Cousinia* Cass. (Asteraceae) persistence through the last two glacial-interglacial cycles in the continental Middle East for the Irano-Turanian flora. Review of Palaeobotany and Palynology 172: 10-20.
- Djavadi, S.B. & Attar, F. 2006. Two new species of *Cousinia* Cass. of sect. *Stenocephalae* Bunge from Iran. Feddes Repertorium 117: 453-458.
- Djavadi, S.B. 2007. New or rare chromosome count in ten species of *Cousinia* from Iran. Rostaniha 8: 19-27.
- Djavadi, S.B. & Attar, F. 2010. New chromosome counts in the genus *Cousinia* (Asteraceae, Cardueae) from Iran. Willdenowia 40: 351-357.
- Djavadi, S.B. 2012. New chromosome count in *Cousinia* (Asteraceae, Cardueae) section *Cynaroideae* and *Stenocephalae* from Iran. Iranian Journal of Botany 18: 86-93.
- Doyle, J.J. & Doyle, J.L. 1987. A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical Buletin 19: 11-15.
- Edgar, R.C. 2004. Muscle: Multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. Nucleic Acids Research 32: 1792-1797.
- Faris, J.S. Kallersjo, M. Kluge, A.G. & Bult, C. (1995). Testing significance of incongruence. Cladistics 10: 315-319.
- Ghaffari, S.M. & Sanaei Chariat-Panahi, M. 1985. Chromosome count of some angiosperms from Iran. Iranian Journal of Botany 3: 67-73.
- Ghaffari, S.M. & Djavadi, S.B. 1998. Chromosome studies and distribution of nine species of *Cousinia* section *Stenocephalae* (Asteraceae) in Iran. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles 121: 61-68.
- Ghaffari, S.M., Susanna, A. and Garcia-Jacas, N. 2006. New chromosome counts in the genus *Cousinia* (Asteraceae) from Iran. Botanical Journal of the Linnean Society 151: 411-419.

گونه‌های این سرده دانستند. به دلیل عدم وجود عدد کروموزومی پلی‌پلوئید در این سرده، احتمال گونه‌زایی از طریق دورگه‌گیری بسیار کم است (López-Viyallonga et al., 2009).

نتیجه گیری

بر اساس مطالعه حاضر، گونه‌هایی از بخش *Stenocephalae* که در مناطق شمال‌شرقی ایران پراکنش دارند از یکدیگر جدا شدن، داده‌های مولکولی و صفات ریخت‌شناسی جدایی گونه‌های *C. decipiens* و *C. esfandiarii* ذکر شده را تایید می‌نمایند. دو گونه *daryushiana* که درفلور ایرانیکا متراծ در نظر گرفته شده بودند در این مطالعه از یکدیگر جدا شدند. جدایی افراد جمعیت‌های گونه *C. esfandiarii* نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

سپاسگزاری

این پژوهش بخشی از رساله دکتری نویسنده اول است که با حمایت مالی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. نویسنده‌گان از دکتر Teresa Garnatje مدیر محترم موسسه گیاهشناسی بارسلونا که امکانات لازم جهت تکمیل پژوهش را فراهم کردند کمال تشکر را دارند.

- Knapp, H.D.** 1987. On the distribution of the genus *Cousinia* (Compositae). Plant Systematic and Evolution 155: 15-25.
- Lee, J., Baldwin, B.G. & Gottlieb, L.** 2002. Phylogeny of *Stephanomeria* and related genera (Compositae-Lactuceae) based on analysis of 18S-26S nuclear rDNA ITS and ETS sequences. American Journal of Botany 89: 160-168.
- Linder C.R., Goertzen, L.R., Heuvel, B.V., Francisco-Ortega, J. & Jansen, R.K.** 2000. The complete external transcribed spacer of 18S-26S rDNA: amplification and phylogenetic utility at low taxonomic levels in Asteraceae and closely allied families. Molecular Phylogenetics and Evolution 14: 285-303.
- López-Vinyallonga, S., Mehregan, I., Garcia-Jacas, N., Tscherneva, O., Susanna, A. & Kadereit, J.W.** 2009. Phylogeny and evolution of the *Arctium-Cousinia* complex (Compositae, Cardueae-Carduinae). Taxon 58: 153-171.
- López-Viyallonga, S., Romaschenko, K., Susanna, A. & Garcia-Jacas, N.** 2011. Systematics of the Arctioid group: Disentangling *Arctium* and *Cousinia* (Cardueae, Carduinae). Taxon 60: 539-554.
- Marcos, S. & Baldwin, B.G.** 2001. Higher-Level Relationships and Major Lineages of *Lessingia* (Compositae, Astereae) Based on Nuclear rDNA Internal and External Transcribed Spacer (ITS and ETS) Sequences. Systematic Botany 26: 168-183.
- Miller, M.A., Pfeiffer, W., & Schwartz, T.** 2010. Creating the CIPRES science gateway for inference of large phylogenetic trees. In Proceedings of the Gateway Computing Environments Workshop (GCE), New Orleans, LA, 8 pp, available at: <http://www.phylo.org>.
- Nylander, J.A.A.** 2004. MrModeltest v2. Program distributed by the author. Evolutionary Biology Centre. Uppsala University, Uppsala.
- Parsa, A.** 1945. *Cousinia* in flore de l' Iran. vol. 3. Tehran University Press, pp. 480.
- Post, G.E.** 1933. Flora of Syria, Palestine and Sinai, vol. II. American University of Beirut, pp. 84-87.
- Rechinger, K.H.** 1986. *Cousinia* morphology, taxonomy and phytogeographic implications. Proceedings of the Royal Society. Edinburgh, B., Biological Sciences 89: 45-58.
- Rechinger, K.H.** 1972. Compositae-Cynareae I: *Cousinia*. – In: Rechinger K.H. (ed.), Flora Iranica vol. 90. Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 329 pp.
- Rechinger, K.H.** 1979. Compositae-Cynareae III: *Cousinia*. – In: Rechinger K.H. (ed.), Flora Iranica vol. 139a. Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz, pp: 105-156.
- Saber, A.** 2005. Biosystematical studies on the *Cousinia* section *Stenocephalae* (Asteraceae) in Iran. M.Sc. thesis, University of Tehran.
- Saber, A., Attar, F. & Djavadi, S.B.** 2009. Studies of pollen grains in the sect. *Stenocephalae* (*Cousinia* Cass. Asteraceae) in Iran. Iranian Journal of Botany 15: 114-128.
- Sang, T., Crawford, D.J. & Stuessy, T.F.** 1995. Documentation of reticulate evolution in peonies (*Paeonia*) using internal transcribed spacer sequences of nuclear ribosomal DNA: implications for biogeography and concerted evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 92: 6813-6817.
- Shaw J., Lickey, E., Schilling, E. & Small, R.L.** 2007. Comparison of whole chloroplast genome sequence to choose noncoding regions for phylogenetic studies in Angiosperms: The tortoise and the hare III. American Journal of Botany 94: 275-288.
- Susanna, A. & Garcia-Jacas, N.** 2007. Tribe Cardueae. pp: 123-146 In Kadereit, J.W. & Jeffrey, C. (eds.). The families and genera of vascular plants, vol. 8. Flowering plants: Eudicots; Asterales. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Swofford, D.L.** 2002. PAUP*: PAUP*: Phylogenetic Analysis Using Parsimony (*and Other Methods), Version 4.0b10. Sunderland, Sinauer Associates. [Accessed 11 November 2019].
- Trifinopoulos, J., Nguyen, L.T., Haseler, A.V. & Quang Minh, B.** 2016. W-IQ-TREE: a fast online phylogenetic tool for maximum likelihood analysis. Nucleic Acids Research. 44: 232-235. Available from: <http://iqtree.cibiv.univie.ac.at> [Accessed 11 November 2019].
- Tscherneva, O.V.** 1962. *Cousinia* Cass. – In: Shishkin, B.K. (ed.), Flora U.S.S.R. vol. 27. Akademiya Nauk, Leningrad; pp: 108-357.
- White, J.T., Bruns, T.D., Lee, S.T. & Taylor, J.W.** 1990. Amplification and Direct Sequencing of Fungal Ribosomal RNA Genes for Phylogenetics. In Innis DH (ed) PCR protocols: a guide to methods and applications. Academic Press, San Diego 31: 315-322.
- Tscherneva, O.V., Joharchi, M.R., & Ghahremaninejad, F.** 2005. A new species of the genus *Cousinia* (Asteraceae) from Iran. Botanicheskii Zhurnal 90(3): 411-414.
- Zare, M., Khosravi, A.R. & Joharchi, M.R.** 2013. Distribution patterns of the genus *Cousinia* (Asteraceae) in Iran. Iranian Journal of Botany 19: 127-141.

How to cite this article:

Kalouti, S., Kazempour Osaloo, Sh., Attar, F., Susanna, A. & Garcia-Jacas, N. 2021. Molecular phylogeny and taxonomy of species of *Cousinia* section *Stenocephalae* (Asteraceae) in NE of Iran. Nova Biologica Reporta 8: 56-67. (In Persian).

کلوتی، س.، کاظمپور اوصالو، ش.، عطار، ف.، سوزانا، آ. و گارسیا- جاکاس، ن. ۱۴۰۰. تبارزایی مولکولی و آرایه‌شناسی گونه‌های بخش *Stenocephalae* از سرده *Cousinia* (تیره کاسنیان) در شمال شرقی ایران. یافته‌های نوین در علوم زیستی ۸: ۵۶-۶۷.